

2715

30735

TRAITE' DE LA LITHOTOMIE

OU

DE L'EXTRACTION DE LA PIERRE

HORS LA VESSIE,

Avec les Figures.

Par FRANÇOIS TOLET, Chirurgien,
& seul Operateur du Roy pour la Pierre,
Maître Chirurgien Juré à Paris, & de
l'Hôpital de la Charité des hommes.

QUATRIEME EDITION.

30735

A PARIS,

Chez l'Auteur, Fauxbourg S. Germain,
proche la Charité, rue Jacob, ~~500~~ 100.
aux trois Vertus.

M. DC. LXXXIX

Avec Privilege & Approbation.



STANDARD

MADE

IN THE UNITED STATES

OF

THE UNITED STATES

OF AMERICA

AND THE WORLD

AND THE OCEANS

AND THE AIR

AND THE EARTH

AND THE SKY

AND THE SEA

AND THE LAND

AND THE MOUNTAINS

AND THE RIVERS

AND THE LAKES

AND THE CITIES

AND THE VILLAGES

AND THE FIELDS

AND THE PASTURES

AND THE FORESTS



A MONSIEUR
J O N N O T,
T R E S . C E L E B R É
& ancien Maître
C H I R U R G I E N
de l'Hôpital de la Charité
des Hommes,
J U R E ' A P A R I S.



MONSIEUR;

Si quelqu'un censure le

A ij

ÉPI TRE.

*traité de la Lithotomie ,
que je mets au jour , vo-
tre approbation servira
de réplique ; & ceux qui
tiendront le party de la
justice , seront du senti-
ment d'un Homme , qui
jusques à présent n'a ren-
contré que fort peu de pa-
reils dans sa profession.
Vous avez depuis plus de
cinquante années prati-
qué dans le Royaume &
aux pays étrangers cette
opération , & ce qu'il y*

ÉPÎTRE

a de plus rare de la Chirurgie, avec l'applaudissement de tout le monde.

C'est une vérité qui n'est fâcheuse qu'à ceux qui font secret de la Lithotomie, ou qui desirent qu'on les croye seuls capables de faire certaines opérations. Mais vous, MONSIEUR, dont la pensée est de soulager par votre conseil & par votre main ceux qui s'adressent à Vous, & qui Vous de-

ÉPI TRE.


mandent du secours, Vous ne faites point secret de ce qui peut estre utile au public. La bonté que Vous avez eu de me communiquer vos lumieres en est une preuve évidente. Vous sçaviez bien qu'il m'étoit impossible de soutenir le rang d'un de vos successeurs à Paris dans l'Hospital, où la Charité s'exerce à toute heure, de mesme qu'il en porte le nom. Et si quelqu'un ob-

ÉPI TRE.

serve, que je décris la Lithotomie avec exactitude, il sera persuadé que Vous m'en avez enseigné les moyens. Cette raison suffit pour Vous présenter un Ouvrage, dont Vous m'avez donné les principes. Je dois Vous assurer que mes actions seront conformes aux paroles, pour exprimer que je suis,

MONSIEUR,

Votre tres-humble & tres-obeïssant
Serviteur FRANÇOIS TOLET.



AVERTISSEMENT.

QUOIQUE le Lecteur demande pour Preface d'un Ouvrage, le dessein de l'auteur, le motif de son stile, & la raison de sa methode, il ne fera pas besoin d'un long discours pour m'expliquer sur ces trois choses qui sont contenues dans ce Traité que je donne au public.

J'ay dessein de rendre facile la maniere de faire la Lithotomie, qui est une operation fort necessaire, & qui contraint souvent les pauvres de

Avertissement.

quitter leurs pays , leurs familles , & de faire de longs voyages avec peine, ou d'attendre la commodité d'un malade riche, & d'un habile homme , ou enfin de s'exposer à des coureurs pour être soulagez.

Les sçavans ont décrit cette operation; mais parce que leurs methodes & leurs instrumens ont esté changez, & que j'ay fait avec soin des observations sur la pratique des personnes habiles , qui operent tous les jours, je puis avancer quelque chose qui n'a pas esté mis en lumiere. J'avouë qu'il y a plusieurs expressions qui

Avertissement.

ne seront pas approuvées de ceux qui possèdent la pureté de notre langue : mais si on recherche plutôt l'utile que ce qui est agreable par un stile d'Orateur, on y trouvera de quoy se satisfaire.

Un homme qui est humble, peut chercher ou soutenir hardiment la verité ; & comme les corps sombres ne laissent pas d'éclairer par la réflexion des rayons qu'ils reçoivent du Soleil, on peut de même tirer un grand profit des choses qui sont fondées sur l'experience, en décrivant la methode & les circonstances de cette operation selon

Avertissement.

les sentimens d'un des plus habiles hommes du siecle.

Ce Livre est divisé en vingt-trois Chapitres, dont les sept premiers contiennent la theorie de la Lithotomie, pour connoître les causes, les especes, & les differences des pierres, leurs signes, & les prognostics qu'on en doit faire. Dans les quatorze suivans on traitera des choses necessaires, & des differentes methodes pour pratiquer cette operation; de l'extraction de la pierre, de l'uretre, & du phimosis, parce qu'on est quelquefois contraint de faire ces operations immediatement de-

Avertissement.

vant la Lithotomie; des accidens de la Lithotomie, & de la ponction au perinée pour la suppression d'urine. Les deux derniers Chapitres traitent des maladies qui restent quelquefois après la taille, & les remèdes pour les guérir, avec le moyen de faire vider le calcul, & de se préserver de la pierre.

Le Lecteur doit estre averty, que je me suis attaché à décrire le plus exactement qu'il m'a esté possible, les circonstances observées dans les méthodes que j'ay veu pratiquer, & que j'ay pratiquées pour le grand & pour le petit appa-

Avertissement.

reil ; les choses contenuës aux Chapitres qui en parlent, sont d'usage , & ils réüfissent : ce n'est pas que je veuille conclure , qu'on n'y en puisse adjoûter beaucoup d'autres ; au contraire je suis persuadé , que si ceux qui sont les plus expérimentez vouloient se donner la peine de les écrire, les Chirurgiens auroient plus de facilité pour operer.

Je ne dois pas oublier de dire, que Monsieur JONNOT a beaucoup contribué à ce Traité, puisqu'il a eu la bonté de m'apprendre avec amitié les choses les plus particulieres, que j'ay pratiquées avec zele en

Avertissement.

sa presence , & dont je fais part au public. Il est certain que les hommes celebres sont accompagnez de l'envie , qui dira que la pratique de l'Hôpital de la Charité de Paris n'est pas la plus salutaire , & que celle dont quelques Operateurs se servent , est particuliere & plus assurée : mais outre que le plus grand nombre guerit dans cet Hôpital , ceux qui l'ont veu pratiquer , faisant reflexion que c'est une methode aisée , confirmée par plusieurs sçavans & experts Chirurgiens depuis la fondation de ce Lieu Charitable , ils demeureront d'accord , qu'il importe peu si

Avertissement.

elle n'est pas semblable à celle des Operateurs , qui n'étant pas Chirurgiens , blâment ce qu'ils ne pratiquent pas. Si les Critiques sont animez du desir de communiquer charitablement leur methode , il leur est facile d'en faire connoître la difference , en rendant public ce qu'ils veulent faire passer pour secret.

On souhaite que les Chirurgiens qui ont esté presens à cette operation , puissent par la lecture de ce Traité se souvenir de ce qu'ils ont veu pratiquer , & qu'ils se rendent hardis ; ou s'ils n'ont point veu faire de Lithotomie , on espere

Avertissement.

qu'ils s'en formeront une idée, qui les aidera pour faire cette operation. Si quelques personnes ont la bonté de donner leurs avis, & de faire part de leurs observations sur cette matiere, on fera connoître les authcurs, de mcfme que Fabritius Hildanus, qui ne s'est point attribué ce qu'il a écrit. Par ce moyen ils feconderont l'intention de celuy qui a la pensée de faire plaisir au public par le recit de la verité.



Handwritten text in Devanagari script, likely a title or header section of a document.

Handwritten text in Devanagari script, appearing to be a list or a series of entries.

३

Handwritten text in Devanagari script, possibly a signature or a concluding note.



TRAITE
DE LA
LITHOTOMIE
OU
DE L'EXTRACTION
de la pierre hors la vessie.

CHAPITRE I.

Ce que c'est que Lithotomie.



A Lithotomie selon son etymologie signifie separation de la pierre. On auroit parlé plus juste, si on s'étoit

servi d'un terme qui auroit fait connoître la partie qu'on ouvre par le trenchant de l'instrument , parce que la division ou separation de la pierre arrive contre l'intention de l'Artiste ; je me serviray néanmoins du mot de Lithotomie , qui est en usage , & entendu par toutes les personnes de la profession. Pour penetrer plus avant , & donner sa définition , c'est une operation de Chirurgie , qui se pratique pour tirer les corps étrangers durs retenus dans la vessie.

Par les corps étrangers on comprend toutes les choses qui sont retenues dans le corps humain contre le cours ordinaire de nature : & comme dans la vessie il y a quelquefois plusieurs choses qui obligent de l'ouvrir , on a mis dans la définition les corps étrangers , plutôt que la pierre ; & pour differencier davantage , on a ajouté que

DE LA LITHOTOMIE. 21
c'étoit seulement pour ceux qui étoient durs, & qui étoient retenus dans la vessie, qu'on pratique la Lithotomie.

CHAPITRE II.

Des observations sur les parties du corps humain.

LEs vaisseaux & les pores des glandes sont les conduits ordinaires par où s'écoulent & sont filtrés les corpuscules, lorsque leur grosseur & figure les y fait recevoir; mais si la proportion ne se rencontre pas entre les canaux & les liqueurs qui doivent y couler, elles sont arrêtées; au contraire si les humeurs ont un mouvement fort rapide, elles élargissent les conduits, & les rompent souvent.


Telle que puisse être l'impulsion

des humeurs , leur mouvement diminué à mesure qu'elles le communiquent ; elles ne font point d'effort sensible pour sortir, quand elles sont mûes de tous côtez dans un lieu qui peut s'aggrandir jusques à certain terme, comme la vessie & les bassins des reins : mais quand le lieu qui les contient est rempli, si l'évacuation ne s'en fait pas , elles fournissent les causes de plusieurs maladies ; car les humeurs ayant des parties de différente figure ou grandeur , il s'ensuivra qu'elles ne pourront pas quelquefois se glisser par un même passage. Il est vray que les corps de pareille & de différente étendue peuvent passer par un même canal, le contraire n'est pas impossible , & peut faire le commencement de ces amas, dont les externes & élevez plus que la surface du corps prennent le nom d'abcès , de même que les colle-

Etions internes ont d'autres acceptions : & si ces mêmes humeurs sont composées de parties inégales, & qu'elles se rencontrent dans un lieu étroit & plein de détours, quelques-unes s'y engagent, & par leur liaison forment un corps solide à comparaison du reste. Ce corps par son séjour, & l'apposition d'autres corpuscules, frappe davantage nos sens ; il s'endurcit à mesure que les parties âpres se joignent étroitement, & que les autres s'en écartent, & continuent leur mouvement.

Il en est de même que des petits ruisseaux, où les cailloux separent & retiennent ce qui est bourbeux, comme les glandes, au travers desquelles se filtrent les humeurs : & dans les tuyaux par où les eaux coulent en abondance, quoiqu'ils soient droits, la terre ou d'autres parties sablonneuses qui se détrempent, s'at-

tachent, & y forment une croûte pierreuse, qui avec le temps empêche les eaux d'y couler.



CHAPITRE III.

Des causes de la Pierre.

LA nature des alimens liquefiez n'est point détruite, & leur diversité fait connoître, que leurs parties different en grosseur, en figure & en nombre. Les plus nourrisans, comme la gelée & les consommés, ont toutes ces qualitez, puisque les sucs des animaux, qui en sont la base, sont tirez des parties molles & des parties dures, avec lesquelles ils étoient assimilez, ou qui étant encor dans les vaisseaux & entre les glandes, tendoient à cette assimilation, ou qui en étoient les choses retenues, & les excremens;

ce

ce que les Medecins appellent *retenta*, & *excreta*.

Les autres alimens ont aussi des parties de diverse nature, parce que les corps elementaires sont melangez, de sorte qu'il ne s'en rencontre point de simples, seuls & separez des autres. L'air que nous respirons, & qui nous environne, est rempli de corpuscules detachez des substances differentes, & il contribue à tout ce qui nous survient. Si donc une personne respire un air grossier, s'il boit des vins troubles, gros & couverts, des eaux bourbeuses des étangs, dans lesquelles plusieurs ruisseaux se déchargent, ou de celles qui petrifient les autres corps, ou de celles des neiges fonduës, qui contiennent des matieres dont la boisson frequente peut diminuer le mouvement des humeurs; s'il mange grande quantité de pain sans le-

vain , des oïseaux marécageux , du lait caillé , de la boulie , du vieux fromage , des œufs durs , des fruits pierreux , & encore cruds & âpres, comme les coings , les néfles , les poires ; s'il se nourrit de bœuf , de porc , ou des extremitéz des animaux , des anguilles , des alimens fort salez & épicez ; ou s'il prend souvent des remedes qui font transpirer les plus subtiles parties , comme les sudorifiques & les diuretiques : s'il agit avec trop de violence en quelque temps que ce soit , & principalement après le repas : le long usage , ou les excés qu'il fera de toutes ces choses , seront les causes des pierres , de même que s'il demeure trop oïsis , & s'il dort trop long-temps sur le dos ; parce que les parties terrestres des alimens grossiers peuvent se rencontrer en des lieux où elles s'embarassent en bouchant les passages.

Si ceux qui ont le plus de soin de leur santé ne sont pas exempts de vivre d'alimens , où il y a des parties glaireuses , comme dans les consommés , que doit-on juger qui puisse survenir aux personnes qui boivent & mangent indifferemment toutes choses avec excès , ou même avec modération , puisque les alimens participent d'une matiere terrestre , mêlée d'une autre qui est salée , & que la Chymie nous apprend que dans l'homme il y a des sucs qui liquéfient les alimens , & d'autres qui les épaississent ; d'où on peut conclure que si une de ces liqueurs rend les alimens fluides par son mélange ; mais ensuite étant portez confusément par des voyes qui s'étressissent , il se peut faire que cette même liqueur s'échappe , & se glisse plus facilement que les alimens qui sont retenus dans la partie , & la nourrissent , ou ils la

détruisent , selon le rapport ou la disproportion des humeurs que l'on peut en general nommer alimentaires.

Il en est de même si un suc terrestre est resté avec les alimens après la chilification; car estant circulé par toutes les parties du corps, s'il ne transpire, il demeurera embarrassé , & plusieurs parties semblables se joignant , y formeront une pierre.



CHAPITRE IV.

Des consequences qui se tirent du Chapitre precedent , & comment on définit la pierre.

LE sang est porté à toutes les parties du corps , mais si son mouvement a plus de rapidité qu'à l'ordinaire , il peut élargir les cap-

fules & les ureteres , & faire couler dans la vessie quelques gouttes de sang , ou d'autres parties grossieres mêlées avec les urines , qui seront rouges , bristées & sablonneuses.

On n'urine pas toujours aussitôt que la serosité est séparée de la masse du sang : S'il y a une petite pierre dans le rein elle peut l'ulcerer : Elle descend vers le commencement de l'uretere , & quand elle a des âpretez , ou une grosseur excessive à proportion de la petitesse du canal , elle le bouche , où faisant une dilatation grande par l'impulsion & l'écoulement de l'urine qui la suit , elle se fait un passage jusques dans la vessie , tandis que le malade souffre des coliques nephritiques tres-violentes , & qui luy causent quelquefois la mort : Au contraire , chaque partie molle ayant sa maniere de sentir , si les reins estoient affectez d'un senti-

ment peu exquis , & que les urines, ou les petites pierres eussent élargy peu à peu leurs passages , les glandes ne separeroient & ne retiendroient que fort peu de chose , presque tout ce qui seroit contenu avec le sang couleroit ; & de la même façon qu'au travers d'un crible il peut y passer plusieurs sortes de graines après que les trous sont agrandis , les parties sablonneuses, & les petites pierres , peuvent estre chariées avec les urines jusques dans la vessie , sans que le malade ressentente presque d'incommodité.

Il n'est pas nécessaire d'alleguer que la secheresse , ou la liaison étroite des parties qui composent les reins , contribuë à former la pierre ; parce que dans les cadâvres des graveleux on observe que les reins ont de l'humidité & de la mollesse ; & il est certain que dans le corps vivant ils sont arrousez continuel-

lement de quelque liqueur : & de plus , on ne peut pas dire que la vessie soit étroite & sèche , quoy que les pierres s'y forment plus souvent qu'en tout autre partie du corps.

Il y a de l'injustice d'accuser nos parens , pour soulager le chagrin des incommoditez que nous souffrons , puis qu'on peut en chaque personne prouver les causes du calcul , sans les rejeter sur ceux qui nous ont donné la vie ; & sans les condamner on peut rendre raison pourquoy nous voyons des enfans sujets à la pierre , dont le pere & la mere jouissent d'une santé parfaite.

Nous devons conclure que l'âge & les excès rendent les parties debiles, dont les fibres relâchez font que les obstructions arrivent dans les vieillards , comme dans les enfans ; parce que l'abondance des

humiditez ralentit le mouvement, & les matieres terrestres, glaireuses & superflües, qui ne sont pas evacüees, forment plusieurs maladies de mesme que le calcul.

Une personne est sujete à diverses maladies, selon les alimens. Ainsi un homme sera incommodé de la pierre s'il se nourrit de choses grossieres, & qui peuvent aisément se coaguler dans le corps. On ne manque pas d'exemples fâcheux, puisque les personnes de differens âges ; sexes & conditions en sont atteints, & que le plus grand nombre de graveleux qu'on voit dans les Hôpitaux viennent de la campagne, où la plus grande partie des alimens sont fort terrestres, & qu'on y taille plus de petits enfans, qui vivent de cette façon.

Les pierres se forment en toutes les parties du corps, & selon ses dimensions ce qui bouche le passage

prend le nom de sable , gravier , pierre , ou calcul : Cecy est confirmé par experience ; car on trouve des pierres dans les poulmons , le foye , la vessie du fiel , la ratte , les reins. Paré l. 25. ch. 15. rapporte en avoir tiré une du genoüil d'un homme. On en trouve dans le cœur : celles qui se forment dans les nerfs sont nommées par Paul *Ægynette nodosa nervorum concretiones*, des endurecisseimens pleins de nœuds. On remarque même qu'il se forme des corps pierreux autour des dents : je connois un homme à qui il en est sorti une par le nombril il y a plus de vingt ans : Elle estoit de la grosseur d'un noyau d'olive. Il est encore vivant.

Les pierres se forment plus souvent dans les reins & dans la vessie, parce qu'elles sont destinées pour separer & contenir la serosité qui entraîne toujours un sediment ter-


restre , qui fait séjour avec l'urine ; & les pierres des reins & de la vessie font plus souffrir le malade , parce qu'elles peuvent empêcher l'écoulement , ou irriter les parties dont l'usage est fréquent , & le sentiment plus exquis que beaucoup d'autres.

Enfin , nous pouvons conclure que la pierre est un corps étrange , dur , engendré des parties terrestres & glaireuses des alimens.

On a mis dans la définition le mot *glaireuses* , pour le distinguer de visqueuses , parce que les choses visqueuses ne s'endurcissent pas dans un lieu où il y a une chaleur médiocre , & de l'humidité : mais celles qui sont glaireuses , comme le blanc d'œuf , s'endurcissent peu à peu , & font une liaison avec ce qu'elles contiennent de terrestre , lors qu'elles sont long-temps dans des liqueurs tièdes.

On peut confirmer cette proposition par l'expérience de ceux qui rendent des urines grasses, & qui ne sont point incommodés de la pierre ; & les remèdes onctueux & visqueux, comme la therebentine, soulagent les graveleux ; De plus, les urines claires & glaireuses sont mises au nombre des signes de la pierre dans la vessie.

Les Auteurs sont partagés pour décider si la pierre est une maladie. Si on considère toutes leurs raisons, elle en peut prendre le nom, aussi-bien que celui de cause.



CHAPITRE V.

Comment les pierres sont formées & augmentées dans la vessie.

IL ne faut qu'un grain de sable, un corps dur pour servir de cen-

tre ou de fondement aux pierres monstrueuses , qui causent de la terreur à ceux qui les regardent, & le plus souvent la mort à ceux d'où on les a tirées.

Le sable , & les autres choses qui sont avec l'urine , ne sont pas quelquefois entierement evacuées. Leur séjour donne le temps à ce qui reste de s'amasser en quelque endroit , & après avoir uriné , s'il y a dans la vessie un peu de sable & des glaires comme des blancs d'œufs , la chaleur estant contre nature , la separation & l'éloignement de l'humidité les fait joindre de la même façon que les parties tartareuses & salées du vin ; & l'urine des graveleux qui découle dans la vessie , estant mélangée d'autres parties terrestres , fournit une matiere qui se joignant à ce qui estoit resté , forme & augmente la pierre : L'expérience nous enseigne qu'on trouve

des pierres qui sont à peu près comme un amas de sablon avec des blancs d'œufs , ayant si peu de solidité , qu'on ne peut éviter qu'elles s'écrasent aux prises des tenettes.

Si un peu de sable peut estre le centre ou le noyau des plus grosses pierres , il en est de même d'un corps dur qu'on auroit introduit dans la vessie , & qui y seroit resté , comme nous l'avons veu dans un Soldat Italien ; qui , pour estre soulagé d'un mal qu'il ressentoit , s'introduisit dans la verge un fer d'éguillette long d'environ deux pouces , qui glissa dans la vessie , & le garda huit-mois. Il vint au Printemps en l'année 1677. à Paris dans l'Hôpital de la Charité des hommes , où sans s'arrêter à son recit , je m'assuray par la sonde qu'il y avoit une pierre dans la vessie. Il fut taillé , & on luy tira le fer , autour duquel il s'estoit formé une

Pierre , qui n'empéchoit pas qu'on ne l'aperceût en plusieurs endroits. Paré livre 25. ch. 15. rapporte une chose semblable. Fabritius Hildanus, l. de Lith. c. 3. col. 2. écrit qu'un Genevois mourut après s'être plaint de la pierre pendant ving-huit ans, & qu'on luy trouva une pierre dont le noyau estoit une balle de plomb petrifiée , & qu'il l'avoit gardée pendant tout ce temps ensuite d'un coup d'arquebusade. Joseph Couillard , Obs. VII. de ses Operations, assure qu'il a vu une pierre dont le centre estoit une balle de mousquet, restée dans la vessie d'un Gentilhomme , cinq ans auparavant qu'on luy fist l'operation.

J'ay traité un jeune homme qui avoit esté taillé à l'âge de quatre ans , & qui estoit incommodé d'une fistule : Depuis ce temps il s'étoit fait une décharge de l'urine dans le scrotum , où peu à peu il s'estoit


formé une pierre de la grosseur d'un petit œuf de poule : Le bout se terminoit en queue de poire.

On ne peut pas déterminer en combien de temps la pierre est formée & augmentée ; cela dépend de la liaison des parties du sable , & de la secretion prompte qui s'en fait dans la vessie : De plus, il se peut faire que la pierre demeure à certaine grosseur , parce que de nouveaux corpuscules ne s'y attachent pas toujours.


Je connois une personne qui en porte une depuis plusieurs années, située au commencement du péri-
née, proche le scrotum, sans y remarquer ou dilatation , ou douleur.

L'accroissement des pierres dans la vessie, ne se fait pas sans que cette partie reçoive de l'alteration, & elle s'affoiblit à mesure que la pierre augmente. Cette remarque don-

ne le moyen d'expliquer pourquoy la vessie des graveleux est plus épaisie que l'ordinaire, dont la cause n'est autre que la débilité de la partie; parce que ne pouvant pas renvoyer le superflu du sang, elle en est augmentée comme l'uterus dans le temps de la grossesse, & les parties où il y a eu fracture, grande contusion, ou une playe; & de même que par la suppuration, ou la transpiration aux playes, fractures & contusions, ou par les vuidanges qui suivent l'accouchement, les parties reprennent leur grosseur naturelle, la vessie estant déchargée du fardeau qui l'incommodoit; & de plus aidée par les remedes & par le regime de vivre, elle se rétablit.

Bev.c.  V. de Cal. Ren. & Vesicæ.





CHAPITRE VI.

Des especes des pierres.

LA difference qui se connoist facilement se tire de la grosseur.

Les moindres pierres des enfans de trois , quatre à cinq ans , sont comme de gros pois ; ou de la grosseur des cerises. Ceux de sept, neuf , douze à quinze ans , en ont d'un peu plus grosses : Aux adultes, qui sont d'âge mediocre , & aux vieillards , jusques au dernier periode de leur vie , on en trouve de la grosseur des œufs de poule.

On ne pretend pas déterminer au juste la grosseur des pierres de chaque âge , il n'y a pas de règle, & on se contente de dire ce qu'on remarque pour l'ordinaire ; car aux

enfans & aux hommes , on en tire quelquefois de plus petites , & d'autres qui sont d'une telle grosseur , qu'on les nomme Monstrueuses , par rapport au sujet.

La chose contenuë fait quelquefois prendre la figure à ce qui l'environne , mais les pierres la reçoivent plustost que de la communiquer. La vessie , l'urine , ou le choc d'autres corps , sont les causes de plusieurs differences. Ne voit-on pas que l'eau cave les rochers , quoy qu'elle tombe goutte-à-goutte ? On peut observer quand la pierre se forme par des minuties qui ont des angles , l'urine ou son sel en emousse les pointes , & le sable mouillé n'ayant pas assez de fermeté , s'applatit par les costez de la vessie quand il y a peu d'urine , & forme une pierre plate & polie , approchant de la figure ovalaire de la cavité du lieu. Quo si les minuties



des pierres sont rondes , elles roulent à droit & à gauche dans la vessie ; & lors qu'elles se dessèchent après estre jointes , elles forment des pierres âpres , dont la surface est spherique , avec de fort grands pores ; comme il est représenté par les figures suivantes , inégales de même que des framboises , ou des mûres. Au contraire , si elles sont composées de minuties approchantes des triangulaires , le contraire se trouvera , & elles auront leurs surfaces moins inégales.

A, B, pierres graveleuses, qui sont les plus rondes.

C, D, E, F, G, pierres qui n'ont point de nom que celui des choses à quoy elles ont du rapport , comme amande , œuf de poule , &c.

On peut encore observer qu'il y a beaucoup plus de pierres plates & polies à la surface , que de rondes & relevées de pointes : ce qui fait

juger que le plus grand nombre est formé par des minuties , dont les pointes sont emoussées.

La surface des pierres & leur épaisseur , n'étant pas toujours uniformes , leurs particules sont différemment figurées ou disposées. En effet , on ne peut pas soutenir que tous les alimens soient de même nature , non plus que toutes les choses (dont la pierre est formée) soient pareilles : Et quand même on demeureroit d'accord que les corpuscules pierreux seroient d'une même figure , leur grosseur différente , & l'arrangement à raison de leurs angles inégaux , qui les embarrasseroient les uns entre les autres , donneroient lieu à de plus grands pores que s'ils estoient disposez de la maniere la plus conforme à leur nature , pour faire tous ensemble un moindre volume : Et de plus , entre les grands pores des minuties

globuleuses , il se peut introduire des corpuscules autrement figurez, qui diminuent la grandeur de ces pores.

Les minuties des pierres estant petites , la pierre aura un grain fin, & sera plus polie. Les corpuscules qui sont gros & approchans des globules , rendent le grain gros , & les pierres plus legeres; parce que leurs pores sont pleins d'urine , ou d'une autre matiere tres-subtile , & beaucoup moins pesante que les parties de la pierre ; & par consequent de deux pierres de même grosseur , la moins polie sera plus legere , & un dissolvant agiroit bien plutôt sur celles qui sont globuleuses & inégales , que sur les plus polies en leurs surfaces.

Lorsque la pierre commence à se former par des corpuscules globuleux , ils sont tellement disposez, qu'ils contiennent de l'humidité

dans leurs pores ; l'augmentation se faisant en peu de temps, cette eau est renduë plus subtile par la chaleur à mesure que la pierre s'endurcit, & pour lors cette humidité acquiert un mouvement qui peut écarter les parties du centre , & se faisant un passage assez grand pour transpirer, mais trop petit pour permettre l'entrée à d'autres corpuscules terrestres, cette pierre sera creusée dans son centre.

Les minuties approchantes le plus du triangle, font la liaison des autres particules, parce que les figures tétragoniques, & les triangulaires, sont plus capables d'empêcher le mouvement que les spheriques.

Les pierres dont les pores sont pleins d'humidité, sont moins dures, & cette dureté sera plus ou moins grande, selon la quantité d'aquositez qu'il y a depuis le noyau jusques à la surface ; ce qui les fait

nommer des pierres molles , s'il y en a beaucoup ; on les appelle pierres dures , s'il n'y en a point , & que les parties de la pierre soient étroitement jointes. Il est certain que les dures sont plus pesantes que les molles.

On tire quelquefois des pierres dont le centre est globuleux , & la surface égale ; la raison est qu'entre les pores des parties du noyau, d'autres corpuscules plus petits & moins ronds se placent , & forment une croûte pierreuse laquelle a le grain plus fin. Au contraire , les minuties ayant formé depuis le noyau une épaisseur égale , si plusieurs corpuscules globuleux s'y joignent avant que la pierre soit endurcie , elle sera raboteuse & âpre en sa surface.

Si la pierre est formée dans le rein , & qu'elle y prenne accroissement , elle sera figurée selon les cavitez dans lesquelles ses branches

s'étendront. Il suit de là que la pierre qui est formée & augmentée au col de la vessie, aura une figure oblongue, cilindrique, ou de figure de poire, ayant un bout plus menu que l'autre : Mais si les particules commencent à se joindre plus haut vers le fonds de la vessie, il n'y a pas de repugnance qu'en même temps les corpuscules soient écartez sans se toucher entre les rugositez de la vessie, & qu'ils y forment des pierres qui changent de place, & qui par des collisions reciproques seront lissées ; de même qu'on peut faire l'épreuve avec deux pierres mediocrement dures, & un peu d'eau, & elles auront un ou plusieurs costez applatis, comme il est représenté dans les figures contenuës dans le petit espace de la planche precedente, page 43.

Cette experience instruira ceux qui n'ont pas veu faire souvent l'operation


peration , parce que considerant les pierres , ils jugeront s'il y en a plusieurs , qui sont quelquefois uniformes ou inégales dans leur épaisseur. Il est rare d'en trouver couvertes d'un kiste , ou d'une humeur glaireuse ; il y en a qui sont adhérentes , comme celles qui ont des épines & des âpretez , que l'on nomme pierres graveleuses , pour les distinguer de celles qui sont polies , rondes , ou ovalaires. Les unes sont plus dures & plus pesantes ; d'autres sont graveleuses seulement au centre , ou à leur circonférence. On en trouve qui sont caves dedans , & d'autres qui sont solides comme à leur superficie. On prend des différences à raison de la situation puis qu'il y en a dans l'uretre , au perinée ; au col de la vessie , dans son fonds , entre ses tuniques , dans les uretres , & dans les reins , ou à d'autres parties du corps. On en trouve de couleur

grise dans la vessie du fiel ; celles des jointures & des abcés phlegmatiques sont blanchâtres , & celles des reins & de la vessie sont rouges , grises , blanchâtres , ou de couleur approchante.

Le nombre ne doit pas estre oublié puis qu'il est quelquefois excessif , & qu'on a trouvé jusques à vingt , quarante , ou soixante pierres dans les graveleux ; mais on ne le limite pas non plus que la grosseur , parce que plusieurs pierres se peuvent former en même temps , ou successivement , & les fragmens qui en sont détachez par les frayemens forment d'autres pierres : ce qui fait que les unes sont plus grosses que les autres. Si une pierre a plusieurs côtez applatis , pour l'ordinaire il y aura trois pierres : il se peut faire qu'il y en ait davantage , ou seulement deux.

Les pierres des taillez ne sont

DE LA LITHOTOMIE. Si point si polies ny si dures que les cailloux de la terre; & il n'y a pas tant de pierres adherentes que l'on croit, si on excepte celles qui ont un kiste, ou des épines. Les plus égales ne laissent pas de faire de la peine à les tirer à cause de leur grosseur, & parce que le passage n'est pas suffisamment dilaté, ou qu'elles ne sont pas bien chargées dans la tenète, ou à cause des replis des parties membraneuses par où elles sont tirées. Il est tres-difficile de juger de l'adherance avant l'operation.



CHAPITRE VII.

Des signes Diagnostics & Prognostics des pierres.

FAISANT reflexion sur les causes des pierres & sur leurs

différences , on remarquera la diversité de leurs signes , dont les premiers font connoître la pierre, les seconds s'il y en a plusieurs , & les troisièmes si les suites seront dangereuses. Les signes qui nous font connoître la pierre ou le nombre, sont appellés diagnostics , & ceux qui font juger des suites sont nommés prognostics.

Pour faciliter les moyens de connoître si la pierre est dans les reins & qu'elle descend dans la vessie, nous ne pouvons pas citer un meilleur Maître que Galien, Liv. VI. des lieux affli. chap. II. qui d'écrit les signes de la Néphritique différens de ceux des autres Coliques. L'envie de vomir & les vomissemens grands & fréquens font beaucoup plus de peine à ceux qui ont la colique ; & pour lors ils vomissent des matieres pituiteuses & corrompues plus que les graveleux. Ils sont plus resserrés & ne rendent

aucun vent par bas ny par la bouche ; souvent la colique semble tourner & occuper plus de place , & quelquefois elle augmente en différentes petites parties , mais la Nephritique incommode sans cesse un mesme endroit. Et quoyque la douleur qui occupe un lieu plus élevé que la situation des reins soit toujours produite par la colique , il ne s'ensuit pas , que celle qui est fixe au lieu où sont les reins, soit une marque evidente de gravelle , cette situation ne sert de rien pour la connoistre parce qu'avec ces signes il faut examiner les urines. Les graveleux les rendent claires & pures au commencement , & dans les jours suivans on y remarque quelque chose d'inégal qui descend au fond , & enfin elles sont entierement sablonneuses , ce qui n'arrive pas à ceux qui n'ayant pas la pierre sont tourmentés de col-

ques , parce que s'ils rendent quelques gros excremens on diroit qu'il y auroit de la flatuosité , & souvent ils furnagent dans l'eau , ayant une consistance semblable à ceux de bœuf. Qui plus est , ces grandes douleurs de coliques sont bien plus adoucies par clysteres laxatifs que s'il y avoit de la Nephritique. Il arrive quelquefois que la colique cesse par l'ejection de quelque humeur froide , & pour lors c'est un remede qui n'adoucit pas seulement, mais qui guerit & qui fait connoistre le mal. Enfin de mesme que les uns sont gueris par les excretions d'humeurs froides , les autres sont delivrez de leur mal en rendant la pierre avec l'urine , & en mesme temps on reconnoist quelle partie souffre.

L'on a dit que les matieres des pierres sont toutes les choses glaireuses & terrestres liées ensemble.

selon le plus ou le moins qui forment un corps dur. Cette pierre poussée contre les costez de la vessie , cause douleur , inflammation , ulcere , & en fait sortir du pus de même que l'acrimonie des humeurs , des urines & des abcez. Les petites pierres peuvent sortir avec l'urine , quelquefois elles sont arrestées au sphincter ou dans l'uretre , elles blessent les nerfs du col de la vessie qui se communiquent jusques au couronnement qui est le commencement du gland ; elles peuvent pareillement , si elles sont grosses , estre cantonnées ou presser le rectum , & causer une pesanteur extr'ordinaire , parce que ces parties ne sont disposées de leur nature que pour souffrir le fardeau des choses liquides qui sont moins pesantes que la pierre. Quand elles ont des âpretez , ou estant dans un Kiste , elles sont retenues par les

rugositez de la vessie : Que si elles sont fort legeres. & sans adherence, elles flottent quelque temps dans l'eau , mais par leur pesanteur elles descendent vers l'uretre , & moins elles sont grosses ou moins inégales en leur surface , plus elles tiennent le passage fermé , parce que les petites pierres se glissent facilement dans l'uretre. & que l'urine peut couler entre les âpretez de la pierre. Cette obstruction empêche le passage de l'urine ; oblige les malades à se coucher sur le dos , ils se tournent avec violence & promptement pour faire changer la pierre de situation afin de faciliter la sortie de l'urine ; & parce que la douleur fait mouvoir les esprits vers les parties voisines , elles souffrent une tension extr'ordinaire qui contraint les hommes & les petits garçons de se tirer la verge & le prepuce pour appaiser la douleur , & pour cét effet

ils croisent les jambes & se présentent les cuisses; de plus, si la pierre change de place, il sort un peu d'urine claire ou mêlée de glaires; selon les mêmes principes, elle peut boucher le passage, ce qui oblige les graveleux d'avoir souvent envie de pisser. Ils sont ordinairement alterez, parce que les esprits & les humeurs se dissipent & s'épuisent par les travaux, les douleurs & les veilles.

Ces observations font juger qu'il y a plusieurs signes diagnostics qui sont équivoques, comme la verge & le prepuce trop allongez par les mains du malade tourmenté d'inflammation, douleur & sortie du pus, des urines acres & du gravier; parce que les matieres sablonneuses ou les petites pierres ayant causé leurs symptômes, peuvent estre évacuées avec les urines; néanmoins, lorsqu'elles ont une hypostase mêlée

de sable & de flegme grossier, qu'il y a quelque écaille de pierre dedans, ou tirée par la verge, on en prend une forte conjecture, qui pour l'ordinaire sert de signe certain.

Les signes diagnostics univoques, peuvent estre tirés des mesmes observations, comme une douleur subite & fixe aux lombes, à l'un ou à l'autre costé ou à tous les deux vers le lieu où les reins sont situez, ensuite de laquelle les urines sont rougeastes ou sablonneuses, ou quelquefois crües, claires & aqueuses, l'engourdissement de la cuisse du costé où est la douleur quand la pierre est grosse : il y a une demangeaison vague & inquiète vers le pubis & au bout de la verge, accompagnée d'une frequente & subite suppression d'urine, douleur & une pesanteur au perinée avec ardeur continuelle d'urine, & quand après avoir pissé

aussi-tost l'envie en reprend. On peut remarquer pourquoy les épreintes pressent jusques à pousser le siege dehors & que l'urine s'arreste tout à coup quand on est debout, ce qui n'arrive pas dans une autre situation.

De tous les signes diagnostics un des plus certains est l'intromission d'un doigt dans le rectum aux hommes. Le Chirurgien sent un corps dur entre son doigt & le pubis ou un peu plus haut. Si le doigt n'est pas assez long, on se sert de la sonde cave nommé cathéter, qu'on introduit par l'uretre dans la vessie, on sent quelque chose de dur avec un bruit sec & resonnant de mesme que si on touchoit sur de la pierre, c'est le plus certain de tous les signes diagnostics. Il est tres-necessaire d'en faire l'experience sur les morts, ouvrant la vessie & y mettant des pierres;

après avoir coufu les parties on introduit la sonde par la verge.

Les sondes dont on se sert pour connoistre si les femmes ont la pierre , sont d'une autre figure , on les représentera avec celles des autres instrumens.


Lors que la pierre est couverte d'une membrane particuliere , ou qu'elle a esté formée entre les membranes de la vessie , ou que c'est une vieille excroissance de chair endurcie , dit Sarcome , lesquelles maladies sont rares , ou si c'est un corps fongueux, on ne peut pas sans peine en faire le discernement , parce que les symptomes de ces maladies en cette partie sont fort semblables , mais la pierre y est beaucoup plus frequente , & on ne se trompe point pourveu qu'on soit attentif à sonder.

Ce que nous avons dit des causes externes des figures nous sert de si-

gues pour predire la pluralité des pierres auxquelles on voit des marques de collision. Lors que dans le temps de la curation, on tire quelque pierre sans y en avoir laissé, cette production est appelée *carrière*.

On peut, examinant la figure & la grosseur de la pierre après l'opération, juger que les suites seront fâcheuses. Car si elle est monstrueuse les parties ont esté fort dilatées & contuses, & si elle est graveleuse & pointuë, il y aura eu dilaceration ou adherence, & quelquefois complication. Les pierres qui ont beaucoup d'âpretez, ne sont jamais si grosses que celles qui sont égales dans leurs surfaces, pour deux raisons. La premiere parce que les minuties qui composent ces pierres âpres, n'ont pas tant de liaison, & qu'il s'en peut détacher quelques-unes qui coulent avec l'u-

rine ; La seconde , parce que ces inégalitez causent plutôt de la douleur & plus cuisante que les autres figures , & pressent le malade d'avoir plus promptement recours au Chirurgien qui fait l'opération auparavant qu'elle ait eu le temps d'augmenter.



CHAPITRE VIII.

Des choses que le Chirurgien doit observer avant l'opération.

Hippocrates ayant fait serment de n'entreprendre point la Lithotomie , nous a instruit de la nécessité qu'il y a d'en observer toutes les circonstances. Pour cet effet quand un Chirurgien pretend faire la Lithotomie , il doit se former la notion ou l'idée de s'ouvrir

un passage à la vessie par un endroit convenable pour extraire la pierre ; il connoistra par ses preceptes s'il peut operer ; ensuite il s'y determinera : Celuy qui est incommodé de la pierre, est sa matiere ou son sujet ; & il est du devoir & de la science du Chirurgien de prévoir les suites, afin qu'il se munisse des remedes necessaires contre les accidens de la matiere & de l'operation.

Le Chirurgien qui est mandé pour sonder ou pour tailler un malade, doit se faire distinguer des Charlatans. Il luy sera facile, observant ce qu'on apprend dans les principes de Chirurgie, où l'on traite des qualitez du Chirurgien & des serviteurs.

Entre les principales conditions il doit avoir une grande connoissance de l'anatomie, pour sçavoir la conformation & la situation des par-

ties , afin d'operer avec la circonspection necessaire , estant hardi sans estre temeraire. Il doit faire connoistre sa prudence , fai'sant son prognostic sur les choses infructueuses , perilleuses , & sur celles où il peut reüssir selon les regles de son art , sans faire trop valoir par un flux de paroles inutiles , les moindres circonstances & les evenemens qui ne dependent pas de luy.

Il considerera l'état , les forces & l'âge du malade , car connoissant qu'un homme est proche de la mort , auparavant de le sonder , il fera remarquer aux assistans qu'on ne doit point le couvrir d'opprobre si on ne peut le sonder , ou même si la sonde estant introduite dans la vessie que le malade n'urineroit point ou fort peu à cause de sa debilité , parce qu'un malade tombe quelquefois dans une suppression apparente sans y avoir de

l'urine : Cecy m'est arrivé il y a environ trois ans. Je fus mandé dans la rue de la Harpe chez M. Tartarin Avocat ; pour le sonder. Il estoit fort âgé , moribond , hydropique , & il n'avoit point uriné depuis trois jours : Je ne le sonday point ; il mourut une heure après que je l'eus veu , en l'ouvrant on ne trouva pas une goutte d'eau dans la vessie , les ureteres estoient resserrez en sorte que l'urine n'y avoit pû passer.

Le Chirurgien doit estre informé par la bouche du malade & des assistans , des choses secretes & des maladies auxquelles il est sujet ; des excez qui ont peu contribuer à son indisposition , on ne doit rien luy celer à cause des remedes & des sondes qu'il doit choisir.

Hippocrates au livre VI. aph. VI. témoigne que les vieillards guerissent avec peine des maladies des.

reins & de la vessie ; & au VI. des Epid. VII & XIX. Il assure qu'il n'en a point veu guerir au delà de cinquante ans ; parce que selon Cœlius Aurelianus leur vessie est nerveuse & qu'ils ont peu de chaleur ; de plus elle est située trop haut , de sorte que les remedes n'y peuvent estre portez. Ils ont peu de force , & beaucoup d'excremens coulent continuellement. Il y a neanmoins assez souvent des taillez qui guerissent quoy qu'ils soient plus âgez.

On peut tirer un bon presage pour la curation , quand l'operation est faite , si le malade dort , si sa respiration est égale , sa langue humide , & s'il a peu de soif sans vomissement ; le bas-ventre peu ou point tumefié avec douleur mediocre & la fièvre legere ; parce qu'en telle disposition l'inflammation cesse presque le cinquième ou septième

jour selon Celse.

Il doit ſçavoir que le malade meurt plus ſouvent par les accidens qui accompagnent ou qui ſuivent l'operation, que par les pierres lors qu'elles ſont dans la veſſie.

Si le malade eſt trop foible, on doit laiſſer reparer ſes forces, autrement l'operation le reduiroit à un peril evident, & le Chirurgien en doit donner avis pour éviter le blâme. Auparavant l'operation on doit attendre quelque temps pour faire la coction des alimens qu'on aura fait prendre au malade, afin que l'habitude du corps ſe reſſente de la nourriture.

Ceſe remarque que les gens de lettres ont la plûpart l'eſtomac debile, & qu'ils ne ſont pas robuſtes à cauſe des veilles ou de la trop longue étude.

Les remedes de pharmacie ne peuvent guerir les gravelleux, &

ils soulagent seulement lors que les pierres sont tres-petites dans les reins ou dans la vessie , & qu'elles sont comme une matiere facile à mettre en poudre ou à sortir avec les urines. Le Chirurgien doit faire son prognostic examinant, s'il peut, la grosseur de la pierre avec le doigt mis dans le fondement ; s'informant du temps que le malade s'en plaint, observant la saison , le lieu & les autres circonstances que les principes de Chirurgie font connoistre.

Ceux qui ont la jaunisse , ou qui sont hydropiques ne sont pas assez forts pour resister à l'operation.

Les signes de la gravelle ayant paru si les urines après avoir esté sanglantes sont remplies de pus, elles font connoistre qu'il y a ulcere aux reins ou à la vessie , causée par les âpretez des pierres, & qu'il n'y a point d'esperance que l'ulcere des reins puisse guetir, parce que pour

en faire descendre les pierres , il est besoin de remèdes qui picotent , & pour les ulcères , il faut des médicamens contraires : quelquefois la nature irritée ou aidée par les remèdes diuretiques , se décharge de ce fardeau , & donne lieu de soulager les douleurs du malade.

Le Chirurgien ne doit pas espérer de guérir le malade , si après l'opération la Néphritique continuë long temps avec des douleurs quelquefois pesantes , & quelquefois aiguës , parce que c'est un signe qu'il y a dans le rein une grosse pierre , ou plusieurs petites qui y sejourment & y prennent accroissement.

Un malade étant dans une suppression d'urine ne peut pas guérir après trois jours , si il est dans un assoupissement , & si il a grande peine à respirer. Le hoquet est un symptôme mortel.


La goutte qui survient aux gra-

veleux peut quelquefois les guérir, il arrive aussi le contraire par l'abondance des humeurs.

Lors que la pierre est adhérente ou envelopée d'un Kiste , ou qu'on rencontre un corps fongueux ou sarcomateux , on doit peu à peu en procurer la séparation par injections & medicamens deterifs moderez.

Les enfans guérissent plus facilement & en moins de temps de cette operation , parce qu'ils ont l'esprit plus tranquille , & moins travaillé de leurs passions , estans plus proches des principes de la vie , que ceux qui sont avancés en âge.

Pendant qu'on prepare tout, il est du devoir du Chirurgien de consoler le malade , donnant ordre qu'on administre les remedes spirituels.



CHAPITRE IX.

De la methode de sonder.

Les femmes sont moins incommodées de la pierre , parce que leur uretre est plus courte, plus large & plus droite ; aussi ne s'y forme-t'il pas tant de maladie que dans celle de l'homme. Mais comme toutes les personnes sont sujetes à la pierre , après avoir interrogé sur les signes , on doit situer commodement le malade pour le sonder & pour connoître la cause de ses douleurs. Si c'est une femme , on la fait coucher sur le dos , les fesses un peu élevées , & après avoir choisi une sonde courbe seulement par le bout enduite d'huile d'olive ou de quelque autre huile douce , on luy fait mediocrement

éloigner les cuissès. On écarte les nymphes avec deux doigts d'une main, afin que l'orifice de l'uretre paroisse au dessous du clitoris ; alors on introduit la sonde doucement de l'autre main , & on examine s'il y a une pierre.

Il n'importe pas que le bec de la sonde soit tourné vers le pubis ou le vagina à cause de la conformation de l'uretre , & il est bon de ne se pas mettre vis-à-vis la cavité de la sonde de peur de l'irruption de l'urine.


Les hommes doivent estre mediocrement penchez en arriere , ou estre couchez sur le dos pour les sonder plus facilement ; & après leur avoir fait éloigner les cuissès l'une de l'autre , le Chirurgien élève la verge & la tient droite entre le poulce & les doigts indice & du milieu d'une main , faisant découvrir le balanus de son prepuce, ensuite

suite il introduit avec l'autre main doucement jusqu'au fond de l'urètre une sonde huilée, observant de la tenir par le bout où sont les anneaux entre les doigts comme une plume à écrire, avec cette différence qu'on doit cacher les anneaux de la sonde avec les mêmes doigts ayant le dehors de la main à demy-ouverte, tournée vers le pubis, & le bec de la sonde du costé de l'anús ; alors il faut conduire la sonde & la verge vers l'aîne la plus éloignée de celui qui sonde, & en même temps on fait tourner entre les doigts la sonde & le bec vers le pubis. Remarquez que les doigts indice & du milieu touchent un costé de la sonde, & le poulce se rencontre seul de l'autre costé entre les deux doigts ; il faut dans ce moment apuyer un peu plus avec l'indice, qui est situé plus haut que celui du milieu,

enforte que le centre du mouvement se fasse sur le poulce, par ce moyen on fait baisser le veru-montanum, & le bec de la sonde se relève pour presser le sphincter & entre dans la vessie. Voicy la figure.

Dans le temps qu'on tourne le bec de la sonde vers le pubis, il faut tirer un peu la verge, afin que l'uretre soit plus étendue & qu'elle ne se ride point, parce que c'est une partie membraneuse dont les replis peuvent empêcher la sonde de glisser.

Quelquefois quand on a introduit la sonde jusqu'au fond de l'uretre, & qu'on a fait tourner le bec vers le pubis, on est obligé de quitter la verge, & de mettre un doigt dans l'anus, & par une compression legere au travers le rectum & l'uretre, on conduit la sonde dans la vessie, après quoy on retire le doigt & on ne tient plus



la verge.

On oste le stilet de la sonde avant de l'introduire , & quand elle est dans la vessie on la tient par les anneaux entre les doigts indice & du milieu ayant le poulce sur l'orifice de la cavité de la sonde & le dehors de la main tourné vers le ventre du malade : pour lors on donne de petites secousses faisant incliner un peu le bec à droit & à gauche sans tourner la sonde entièrement. On baisse les anneaux afin que le bec monte vers le fond de la vessie , & quelquefois on les approche du ventre sans faire sortir la sonde du sphincter , & par ces sortes de mouvemens , quand on est fort attentif , si c'est une pierre on entend un petit son comme de deux cailloux qui se touchent avec bruit , ou bien on sent quelque chose qui fait une collision à la sonde comme si on la frottoit d'une

pierre. Si elle flotte on la peut sentir quand il y a de l'urine , c'est ce qui oblige de mettre le poulce sur la cavité de la sonde , mais si on ne sent rien , on laisse vuidier l'urine par la sonde & ensuite on examine.

Il y a une autre façon de sonder les hommes. Il faut élever & tirer médiocrement la verge , la coucher presque sur le penil en montant , & poser les anneaux de la sonde vers le ventre en sorte que le bec soit tourné du costé de l'anüs.

Il y a dans la vessie des rugositez qui trompent celui qui sonde , mais on en fait le discernement , parce quel'on sent seulement quelque chose de mol & médiocrement dur qui ne fait point de bruit par l'attouchement de la sonde. Les vessies des enfans n'ont pas de rugositez comme celles des hommes.

En l'année 1681. dans l'Hôpital

de la Charité , au commencement d'une taille on presenta deux enfans pour estre taillez , mais n'ayant point senti de pierre on les recoucha , & après en avoir taillé plusieurs autres ils furent examinez une seconde fois , on reconnut les pierres & on les tailla à l'instant parce qu'ils estoient preparez : ce qui fait voir qu'il ne faut pas se presser de dire son sentiment si quelquefois on ne sent point la pierre après que les signes ont paru , parce qu'elle est petite , ou elle change de place. Dans le même temps on examina un homme avec une sonde à faire uriner : après en avoir incliné le bec du costé droit & l'avoir poussé plusieurs fois vers le fond de la vessie , on approcha les anneaux vers le ventre comme si on avoit eu dessein de faire sortir la sonde ; mais lors qu'on jugea que son bec étoit proche le sphincter de la vessie

on le tourna vers le costé gauche, ce qu'on n'auroit pas pû auparavant à cause de la longueur du bec de cette sonde & de la petitesse de la vessie : on continua de chercher la pierre , qui n'ayant pas esté sentie, fut trouvée avec une autre sonde , dont le bec depuis le commencement de la courbure , n'estoit pas si long , par ce moyen cette sonde tournoit facilement dans la vessie. Cette observation fait juger du choix des sondes pour faire uriner , dont le bec ne doit pas estre si long que de celles qui servent à faire l'incision de la taille & qui sont canelées. Il y a des hommes qui ont l'uretre fort étroite , ce qui oblige d'avoir des sondes menuës comme pour les premiers âges , & longues suffisamment. Il faut pareillement choisir des sondes qui ne se ployent pas facilement , cela dépend de la fabrique de l'ouvrier.

Quand la pierre est au col de la vessie , il n'est pas nécessaire d'introduire la sonde jusqu'à son fond, parce qu'on la sent , pourveu que la sonde soit seulement introduite jusqu'au fond de l'uretre.

Quand il y a une carnosité , qui empêche de glisser la sonde dans la vessie , on met un doigt dans le rectum & on sent un corps dur & pesant vers le pubis s'il y a une pierre.

Lorsqu'il y a grande inflammation , le sentiment de Fernel est , qu'on ne sonde point. Sur cela on doit observer de sonder doucement & rarement , parce qu'on peut causer de la douleur , inflammation , excoriation , ulcere gangrène au sphincter , même la suppression d'urine ou percer l'uretre.

Outre ces maladies on ne peut pas quelquefois sonder à cause du phimosis , & de la pierre dans l'uretre. Il faut dire ce qui est neces-

faire d'en sçavoir pour le sujet de la Lithotomie.



CHAPITRE X.

*Du Phimosis & de la Pierre
dans l'uretre.*

PLusieurs enfans ont des phimosis ; pour les sonder il faut tenir la verge entre l'auriculaire & l'annulaire , le dehors de la main du costé du ventre , & tirer avec les autres doigts le prepuce comme si on vouloit faire découvrir le gland , le poulce d'un costé & les doigts indice & du milieu d'autre, ferrant mediocrement avec ces trois doigts vers l'endroit du balanus où on juge que la couronne du gland est située , par ce moyen l'orifice de l'uretre se dilate davantage.

Alors on introduit la sonde cherchant doucement l'ouverture du gland; on connoitra qu'on est dans l'uretre si la sonde entre facilement & touchant avec les doigts de l'autre main le long de l'uretre par dessous la verge.

Si le prepuce est tellement serré qu'on n'y puisse introduire la sonde, ou si on ne peut rencontrer l'orifice de l'uretre, il n'y a rien à craindre dilatant un peu le prepuce en sa partie laterale avec la pointe du bistouri ordinaire ou des ciseaux bien trenchans.

Remarquez qu'auparavant d'introduire la sonde, il est bon de comprimer la verge le long de l'uretre avec les doigts pour observer si on n'y sent point un corps dur qui empêche le passage comme carnositez ou des pierres. Lorsque c'est une pierre on retire la sonde; & si avant de sonder on a connu que

c'est une pierre , & qu'elle soit située depuis le gland jusques environ le milieu de la verge au dessus des testicules , on ne sonde point , mais ayant comprimé la verge avec les doigts entre le pubis & la pierre , on prend une curette huilée , on l'introduit peu-à-peu , & l'ayant fait passer derrière la pierre , on la tire hors de l'uretre.

La curette est comme un cure-oreille , faite d'acier , parce qu'il ploye moins que d'autre metal. Il en faut avoir de plusieurs grosseurs longues de quatre ou cinq poulces. Elle est figurée au bas de la 2. planche des instrumens, page 91.

On peut dilater l'extremité de l'uretre en la partie supérieure du gland , lorsqu'on tire les pierres avec la curette , & que les ayant conduites jusqu'à l'orifice , elles ne peuvent passer sans peine.

L'urine sert de remede ; & quand il y a eu contusion & de la douleur il suffit de faire embrocation d'huile de roses sur la verge , & mettre sur le balanus un petit plumaceau trempé dans le baûme d'Arceus , fondu avec un peu de miel rosat mediocrement exprimé , avec la cruciale fenêtrée & le bandage à trois chefs pour l'environner , n'oubliant pas s'il est besoin de mettre à l'enfant une ceinture à laquelle on puisse attacher le bandage , même luy mettre un colier comme un scapulaire dont la partie inferieure soit attachée à la ceinture , afin qu'elle ne descende point plus qu'on desire. ¶

Ce bandage sert pour d'autres maladies de la verge , commençant l'application de la bande sur le gland & l'approchant ensuite vers le ventre , faisant de legeres circonvolutions pour contenir le medicament

sur la partie , & quand on est proche du pubis, on fait un noeud médiocrement serré , ensuite on attache à la ceinture les deux chefs qui sont à l'autre extrémité de la bande.


On ne donne point précisément la longueur ny la largeur de toutes les parties de ce bandage , parce qu'il dépend du jugement du Chirurgien de les couper assez longues & assez étroites pour ne point embarrasser.

L'extraction de la pierre qui est dans la verge , lorsqu'elle est éloignée du sphincter de la vessie se fait encore autrement. Après avoir retiré la peau du prépuce le plus qu'on peut vers la racine de la verge , on fait une ligature au balanus entre la pierre & le pubis ; ou bien on tient la verge & la peau sujettes avec les doigts devant & derrière l'endroit où on a remarqué la pierre ; ensuite on fait une in-

cision sur la pierre , un peu lateralement à l'uretre pour faire sortir la pierre par le moyen de la curette introduite dans l'incision. La ligature ostée , la peau relâchée , l'incision se ferme & guerit par le baûme de l'urine sans autre remede.

Si on ne veut pas inciser l'uretre , ou qu'on ne puisse pas tirer la pierre avec la curette , il est bon de donner des remedes diuretiques pour la faire couler vers le gland afin d'en faciliter l'extraction.





CHAPITRE XI.

Du temps pour sonder & pour faire la Lithotomie. Des instrumens, de la diete du malade & du premier appareil.

ON peut sonder en tout temps pour faire uriner & pour connoître la maladie. Si on se sentoit fort incommodé de la pierre, on ne pourroit pas sans peril differer la Lithotomie ; mais comme les maladies contraignent de faire les operations sur le champ, nous ne parlerons point du temps qu'on appelle de necessité ; on traitera seulement de celuy d'élection, qu'on prend quand la maladie est à un degré qui donne lieu de faire les choses sans precipitation & avec ordre.

Le Printemps est la saison la plus tempérée , où le vitriol , pere de toutes les productions , donne la verdure aux plantes & contribue aux forces que les hommes sentent croître en eux. Alors on entreprend tout ce que le froid ou la chaleur excessive des autres saisons avoit fait interrompre afin que dans l'Automne on jouisse des fruits des peines qu'on a prises. C'est donc avec grande raison qu'on choisit le Printemps pour faire plusieurs operations & entr'autres la Lithotomie. Il faut en ce pays attendre que l'impression du froid de l'Hyver & que les pluies frequentes soient cessées. Quoyque le Printemps commence le 21. Mars , neanmoins selon la temperature de l'air , on avance ou l'on differe l'operation de la pierre , ordinairement on la fait au mois de May. Après le Printemps, l'Automne doit être preferé aux autres saisons.

Quand il y auroit en usage des dissolvans de la pierre , nous devons necessairement parler des remedes de Chirurgie , qui sont les instrumens de fer ou d'autre metal propres à servir à la Lithotomie. Voicy leurs figures & les noms de leurs parties.

1. Rasoir pour oster le poil des parties pudibondes.


2. Cizeaux à incisions ordinaires.


3. Sonde cave , dite Cathéter , pour sonder les hommes & les faire uriner , & son stilet pour la nettoyer.

4. Sonde pour faire incision aux hommes , canelée par le dos depuis A, qui est le bec , jusqu'à l'endroit marqué B , sans cavité dans sa longueur.

5. Sonde cave & courbe seulement au bec pour sonder les femmes , & son stilet pour la nettoyer.

6. Sonde droite & creuse depuis





le bec jusqu'à l'endroit marqué C, dont on se sert quelquefois en faisant incision à l'orifice de l'uretre des femmes. Il est bon d'avoir toujours dans l'étuy à sondes, séparément, un petit morceau d'éponge trempé fort mediocrement dans l'huile d'olive, parce que quelquefois on peut en manquer au besoin pour oindre les sondes.

7. Bistori qui s'ouvre comme une Lancette, trenchant & piquant de même ayant la pointe plus mouffe, au fer duquel il y a une queue plate pour le tenir sujet contre la chaise lorsqu'il est ouvert.

8. Languette pour monter le Bistori, elle est fendue par un bout, large d'un doigt, longue d'un pied & demy.

9. Bistori monté, c'est à dire qui est garni de sa languette.

10. Conducteurs dont une paire sert à l'operation. Celuy qui est

plus proche du Bistori monté , est fourchu , & l'autre a une ligne dans la longueur de sa cavité pour conduire le premier. On se peut néanmoins servir seulement de celuy qui est le plus éloigné du Bistori pour conduire la tenette.

II. Autre espece de Conducateur qui est composé des deux cy-dessus figurez ; il est coudé vers le milieu , & garni d'un ressort entre les branches proche les anneaux. Il a esté inventé par Joseph Couillard.

I. Autre espece de Conducateur dit Gorgeret plus commode & plus en usage. Il est cave & s'étreffit par le bout où il y a un bec qu'on introduit dans la canelure de la sonde , tandis qu'on le tient par l'autre bout qui est figuré en T.

Il y a des personnes qui n'approuvent pas ce Conducateur , disant qu'il dilate trop les parties , & qu'il





contribue aux fistules ; mais c'est sans raison , car il est plus estroit que la tenette qu'on retire avec la pierre qui occupe beaucoup plus de place , & la fistule n'est causée que par les suites de l'operation comme on l'expliquera dans son lieu.

2. Tenettes droite & courbe. A Leurs prises. B Leurs branches. C Leurs anneaux.

3. Dilatatoire pour les hommes. Il est nommé dilatatoire composé D Le bec du dilatatoire. E La poignée.

4. Dilatatoire simple pour les femmes. Ses extremités sont mousses & fort étroites , les branches sont jointes en sorte que baissant sur un de ses bouts , les autres s'ouvrent. Il représente la lettre X.

5. Autre dilatatoire qui peut servir pour les femmes & pour les petits garçons. Il a un ressort proche la poignée , & il ne peut dilater que

mediocrement. On s'en peut servir quand on craint d'avoir laissé des brides dans le temps de l'incision.

6. Crochet pour tirer les pierres qui sont au passage, soit au petit appareil ou autrement. Quelques uns font faire des dentelures dans la cavité de sa partie courbée, mais il n'est pas nécessaire qu'il y en ait.

7. Bouton à curette qui est long d'environ dix poulces, & gros comme un tuyau de plume à écrire. F La partie proprement nommée le bouton. G Le corps du bouton. H L'autre bout qui est cave est dit cuillere ou curette du bouton. I Legere ligne pour conduire la tennette.

8. Canule ayant des anneaux par un bout nommée la teste, & l'autre bout la pointe, où il y a deux trous appelez les yeux de la canule.

9. Languette pour monter la ca-

nule l'introduisant dans la fente , & faisant passer les deux extremittez de la languette par les anneaux de la canule. Pour lors on la nomme canule montée. Cette languette est longue de deux pieds , large d'un travers de doigt.


10. Les deux écharpes ou ligatures pour les adultes. Elles sont faites de soye & de laine ensemble, ou comme les padoux. Chacune est longue de quatre à cinq aunes , & large de quatre ou cinq travers de doigts. Si le Chirurgien manquoit d'écharpes ; en preparant son appareil il coupera des bandes de cette grandeur avec de la toile un peu forte pour s'en servir ; il n'y aura rien de perdu , car il pourra ensuite les couper pour servir de fronde & penser le malade.

II. Curette pour extraire les pierres de la verge.

I. Chaise dont on se sert à l'Hô-

pital de la Charité de Paris , sur laquelle on fait monter le malade pour faire commodement l'opération. Il y a au derriere deux triangles de fer en forme d'arcs-boutans. Elles sont crochuës pour entrer dans les anneaux de la chaise , & pointuës par les autres bouts pour tenir plus ferme contre le plancher , parce que le malade fait de la violence dans le temps de l'opération. On doit situer la chaise un peu obliquement au jour afin qu'il frappe sur la main droite du Chirurgien pour en estre éclairé lorsqu'il opere.

Au lieu de cette chaise , on peut situer le malade sur le bord d'un lit , ou sur une table avec un matelas , dont une partie couvre le dos d'une chaise ordinaire renversée , éloignée d'environ demy-pied du bord de la table faisant la figure d'un glacis. Il faut assujettir cette





chaise avec plusieurs liens. Si on n'a point de matelas , il suffit de mettre quelque oreiller de plume ou autre chose pour rendre la place plus molle, & un drap plié par dessus.

2. Drap plié en plusieurs doubles selon sa longueur , pour garnir la chaise qui a esté décrite , ou couvrir le matelas dans le temps de l'operation : une partie est en devant , & le reste pend par derriere.

3. Gibeciere pour mettre séparément les tenettes droites d'un costé, & les courbes d'autre avec le crochet : dans le fond on cache le dilatatoire , le bouton & le conducteur. On peut la fermer , relevant les costez , où il y a des boutonnières par où l'on fait passer les boutons qui sont attachez aux endroits marquez C. D. proche les cordons.

Table sur laquelle on pose l'écuelle avec de l'huile & les bistoris

montez , sous lesquels on met transversalement un morceau de linge plié en plusieurs doubles , afin que leurs pointes ne touchent à rien. Il est bon de monter plusieurs bistoris quoy qu'on n'ait qu'une operation à faire , parce que le trenchant ou la pointe se trouvent quelquefois émouffiez , & il est besoin d'avoir des morceaux de vieux linges & des serviettes.

Tous les instrumens peuvent estre faits d'acier ou de fer , néanmoins les sondes , les conducteurs , le bouton à curette & les canules , sont plus propres quand ils sont d'argent & ils se roüillent moins. De chaque espece il en faut avoir de plusieurs grandeurs qui soient bien polis.

Ce n'est pas assez d'avoir parlé des instrumens de Chirurgie , parce qu'en bonne Methode il faut faire reflexion sur les choses nécessaires

faïres devant, dans le temps, & après l'operation. Auparavant l'operation le malade doit estre préparé par la diete de quelques jours, la seignée, clysteres, purgations plus ou moins reïterées selon l'avis d'un sçavant Medecin; & la veille de l'operation faire prendre au malade un clystere laxatif ou astringent selon la necessité. Il faut le laisser reposer du moins un jour après avoir pris medecine. On ne doit pas oublier les remedes spirituels.

Pour le temps de la Lithotomie; il faut choisir du moins quatre serviteurs fidelles, une chambre medio-crement chaude & en bel air, où la clarté du jour suffise. Il faut un tablier & des gardes-manches pour l'Operateur, & sous la table on mettra une cuvette pleine d'eau tiede pour laver les instrumens. Il y aura sur la table de l'huile d'olive ou rosat, & il disposera ses instrumens

pour operer : on appelle toutes ces choses l'appareil pour l'operation; les remedes & les bandages dont on se sert pour penser le taillé sont nommez l'appareil pour le pensement qui doit estre preparé, parce qu'on s'en sert immediatement après l'operation,

Les medicamens doivent estre astringens, soit poudres, soit onguens, oxycrat tiede, & oxyrodin. Les bandages tant pour les hommes que pour les femmes, sont.

1. Le Colier, qui est une grande bande à seigner; quand elle est liée par les deux bouts, elle represente une ovale, dans laquelle on fait passer la teste, & on fait descendre ce colier jusqu'à l'ombilic. On peut le mettre au malade auparavant l'operation.

2. Compresse mediocrement épaisse, large de trois ou quatre doigts pour mettre sur la playe


Γ



B

B

B





9

10

11



12



quand l'operation est faite, & dans le temps qu'on porte le malade à son lit, elle doit estre mise sur la table avec les bistoris & les sondes.

3. Emplâtre astringente suffisamment grande pour couvrir le ventre.

4. Ventrière qui est une grande compresse pour couvrir le ventre. On la trempe dans l'oxycrat tiede.

5. La Fronde ou bandage à quatre chefs. A, Chefs qu'on peut nommer Congeneres, parce qu'ils commencent au même endroit & qu'ils sont destinez pour un même effet.

6. Le T, double. bb, Ceinture du T. cc, Les queue's du T.

7. Plumaceau couvert d'astringent.

8. Emplâtres à queue de diverse grandeur. On les couvre d'astringent.

9. Emplâtre plus longue que large pour mettre quelques jours après

l'opération sur le plumaceau au lieu de celle qui est à queue. Cette emplâtre doit estre un peu plus longue que la playe.

10. Petite Compresse carrée médiocrement épaisie & un peu plus grande que l'emplâtre cy-dessus figurée.

11. Autre Compresse double, large d'un poulce & longue d'un pied, pour les mâles, nommée la trouffe. On mouille ces deux compresses dans l'oxycrat tiède.


12. Jarettiére qui est une grande bande à seigner pour engager les cuisses, afin que le malade les ait médiocrement proches l'une de l'autre.

13. Lit garni d'une alaise, ou d'un drap plié en plusieurs doubles & mis en travers au lieu où se trouvent les reins & les cuisses du taillé. Il faut avoir plusieurs alaises ou draps pour le changer & le mettre à sec

DE LA LITHOTOMIE. 101
quand il est mouillé. On doit le
bassiner s'il est besoin. Il est bon
aussi d'avoir plusieurs serviettes
pour mettre sous le malade lorsqu'il
a le cours de ventre, afin de le met-
tre plus promptement à sec, & quel-
quefois outre cette alaise on met
une toile cirée ou une petite cou-
verture entre le drap & le matelas
afin de le conserver & que l'urine
ne le pourrisse pas, mais la toile ci-
rée rend le lit trop dur & n'est bon-
ne que lorsqu'on manque de draps
ou de matelas pour changer le ma-
lade. Il ne faut pas oublier de faire
attacher au plancher une corde
pour aider le malade à se soulever.

Ily a des Operateurs qui cachent
les instrumens dans leurs poches,
ou qui mettent les sondes dans les
boutonnieres du pourpoint avant
de les tremper dans l'huile, d'au-
tres les rangent dans un plat, nean-
moins comme on fait du bruit lors-

qu'on les veut prendre pour s'en servir , il semble qu'il est plus commode de les avoir dans une gibeciere.



CHAPITRE XII.

*De la situation des enfans
pour les tailler.*


Tout estant préparé , les sondes mises dans l'huile , les bistoris & les canules montées , posées sur la table , la cuvette & l'eau tiède dessous ; les tenettes droites & courbes mises par ordre avec le crochet au devant de la gibeciere, un conducteur , le bouton à curette , & un dilatatoire , si on le juge, à propos dans le fond de la même gibeciere. On va trouver le malade, on le conduit au lieu de l'operation

& on le fait monter sur la chaise située un peu obliquement, en sorte que le jour des fenestres éclaire le costé droit de l'Operateur, evitant de faire voir les instrumens.

Si c'est un enfant de quatre, cinq, sept, dix à douze ans, deux serviteurs peuvent le tenir par les pieds & par les mains à droit & à gauche tandis qu'un autre monte sur quelque chose par derriere la chaise pour estre plus élevé, & estant de front pouvoir commodement appuyer sur les épaules du malade posant les pouces des deux mains vers le dos & les autres doigts dessus les clavicules. Pour tenir bien, le serviteur qui est au costé droit du malade, doit passer sa main gauche entre les cuisses du malade, & le prendre à nud par le poignet droit, & pour ne pas le blesser on peut luy faire descendre la manche de sa chemise jusques sur la main; ensuite

le même serviteur avec la main droite empoigne la jambe du même costé vers les malleoles. Le serviteur qui est à la gauche du malade fera la même chose, prenant avec la main droite le bras gauche, & empoignant de la main gauche la jambe gauche proche le pied.

Dans cette situation il faut que les mains de l'enfant touchent presque à ses talons, & pour peu que l'on tienne ferme, les cuisses s'écartent & le Lithotomiste a de la place pour operer; & parce que les enfans se tourmentent fort, on peut encore leur faire écarter les genoux par deux autres personnes; observant sur tout que dans cette situation le malade soit à demy-panché en arriere sur le dos selon la figure de la chaise, ou à son defaut proche le bord du lit, ou de la table couverte d'un matelas, enforte qu'on luy voit le fondement.










& que les pieds ne portent sur rien afin qu'il ait moins de force à se mouvoir. En voicy la figure.

Il y a des Operateurs qui choisissent un homme fort qui s'asseoit sur une chaise ordinaire un peu haute, ou sur le bout d'un banc, & après avoir mis un coussin contre son ventre & un drap par dessus, il prend sur ses genoux joints devant luy l'enfant qu'il faut tailler. L'homme ayant les genoux serrez, passe ses mains entre les jambes de l'enfant pour luy tenir les poignets; par ce moyen l'enfant est situé commodement pour estre taillé. En voicy la figure.

Outre l'homme qui tient, il est besoin de quelques personnes pour appuyer sur les épaules de l'enfant, luy écarter les genoux & tenir les pieds sujets.

Neanmoins comme l'operation est quelquefois laborieuse, & que

l'homme qui tient peut se lasser il vaut mieux se servir de la premiere façon.



CHAPITRE XIII.

Des différentes methodes de l'Extraction de la pierre selon les Egyptiens.

Pratique du haut appareil.

LE Chirurgien ne peut pas quelquefois introduire la sonde canelée a cause de la douleur, ou de l'inflammation pour avoir sondé trop de fois auparavant, ou parce que l'on craint de faire trop souffrir le malade, ou qu'il y a carnosité ou callosité, ou parce que la pierre est au perinée ou au col de la vessie.

Ces différentes dispositions obligent de songer de quelle manière on doit faire l'opération. La première qui n'est point en usage, est dite le haut appareil. La deuxième & la troisième se pratiquent tous les jours, on les nomme le petit, & le grand appareil.

Nous ne prétendons pas comprendre les deux méthodes, dont Prosper Alpinus fait le récit dans le quatorzième Chapitre de son troisième Livre de la Médecine des *Ægyptiens*, où il rapporte leur pratique pour extraire la pierre de la vessie sans faire incision, mais seulement par dilatation de l'urètre en soufflant dans la verge.

Quand je demourois en *Ægypte*, dit il, un certain Arabe nommé Haly, fort renommé pour faire l'extraction des pierres sans incision, en tira plusieurs en ma présence à Horam Bey Commandant

Ture. Pour reüssir il se servit d'une canule de bois , longue de huit doigts & grosse comme le poulce, l'ayant appliquée au canal de la verge , il souffla dedans avec grande force ; en même temps il comprima de l'autre main l'extrémité de la partie naturelle vers le perinée pour empêcher que le vent n'entrât dans la vessie. Il boucha ensuite l'orifice de la canule pour faire enfler & élargir l'uretre. Cecy fait , un serviteur ayant mis un doigt dans l'Anus , approcha peu à peu la pierre vers le col de la vessie & au commencement de l'uretre : pour lors cet Operateur sentant que la pierre estoit proche du perinée , il retira avec force & promptement la canule d'auprés le canal de la verge pour extraire adroitement la pierre qui se trouva de la grosseur d'un noyau d'olive. J'estois present à cette operation qu'il fit à ce

Commandant Turc ; & après je la luy vis pratiquer sur deux Juifs , dont l'un estoit un petit garçon à qui il tira huit petites pierres , & l'autre estoit adulte duquel il en tira une grosse comme une olive. Cet Arabe se servoit de cette methode pour tirer les pierres de la vessie.

Dans le même Chapitre il parle d'une lettre qui luy fut écrite par Octavius Roveretus, tres-docte Medecin en *Ægypte* pour la Republique de Venise.

Il y a quelques mois , dit-il , qu'un Arabe de Sidon Chrestien fit l'extraction de la pierre sans incision à un autre Chrestien nommé Cophtus , & ce fut de cette façon. Cet Arabe avoit plusieurs canules de diverses grandeurs, figurées à peu près comme des flûtes qui sont des instrumens de Musique. Elles étoient faites d'une matiere cartila-

gineuse qui pouvoit facilement s'élargir : il introduisoit la plus menue dans l'uretre & la poussoit jusqu'à la vessie, aussitost pour la faire enfler il souffloit dedans de toute sa force avec la bouche, ensuite il retiroit cette canule pour en introduire une plus grosse & souffloit de la même façon continuant & changeant jusques à une quatrième qui estoit la plus grande, & après qu'il croyoit avec ces choses avoir dilaté suffisamment le canal pour faire passer la pierre, ayant premierement situé commodement le malade, il luy mettoit un doigt dans l'anus pour la faire approcher vers le col de la vessie où estoit le bout de cette grande canule dans laquelle il tâchoit de faire entrer la pierre. Après cela il posoit la bouche sur l'autre extremité de la canule, & retirant fortement son haleine il faisoit son possible pour at-

tirer la pierre qui se rompoit souvent quand elle estoit trop grosse, comme il arriva à cet homme-cy nommé Cophtus, car il ne luy en tira qu'une partie, & le reste qui estoit un fort gros fragment & dur ne put estre tiré.

Ce moyen, dit Roveretus, est facile à apprendre, & peut estre qu'un Chirurgien habile pourroit mieux réussir en le pratiquant, ce qui seroit une chose désirée des personnes incommodées de la pierre. Beverovicus fait mention de ces deux methodes tirées de Prosper Alpinus. Mais il vaut mieux sans examiner toutes les circonstances de ces deux methodes donner les descriptions de celles que l'on nomme communement le haut, le grand, & le petit appareil.

De Franco est le premier qui a pratiqué le haut appareil, qui prend son nom de ce qu'on le pratique à

l'Hypogastre , & quoy qu'il ne le conseille pas , si on estoit obligé de le faire , il semble qu'on pourroit y reüssir faisant coucher le malade sur un matelas , & le tenant fermement , un serviteur introduiroit ensuite les doigts indice & du milieu l'un après l'autre dans le rectum afin de faire monter la pierre le plus haut qu'on pourroit , & dans le même temps l'Operateur feroit doucement incision au dessus du pénis & à costé de la ligne blanche. On ne manqueroit pas d'ouvrir le fond de la vessie sans blesser les parties du bas-ventre , parce qu'elle est dans la duplicature du peritoine , & plus elle seroit pleine d'eau plus elle seroit apparente : par le moyen de l'urine on conduiroit le dilatatoire simple , & ensuite le bouton qui , après avoir retiré le dilatatoire , serviroit de conducteur à la tenette. M. Jonnot m'a dit que M. Bonnet


Chirurgien qui pratiquoit autrefois la Lithotomie dans l'Hôtel Dieu de Paris l'avoit assuré d'en avoir taillé de cette façon. M. Petit Maître Chirurgien de cet Hôpital m'a dit l'avoir veu pratiquer sur une petite fille par le même M. Bonnet.

La curation se feroit comme des playes simples du bas-ventre , ou bien l'on changeroit de methode selon les symptomes qui surviendroient. L'experience nous enseigne que les playes de la vessie ne sont pas toujours mortelles.

Si une personne vouloit pratiquer le haut appareil , il seroit necessaire d'en faire plusieurs experiences sur les Cadâvres après même en avoir fait vuider l'urine.

De Franco propose au même endroit Chapitre XXXIII. une autre methode pour tailler , qui est d'introduire une tante immédiatement après avoir fait l'incision , à moins

que la pierre ne se présente d'abord , & quelques jours ensuite quand la douleur est cessée , de faire l'extraction de la pierre. Mais on pratique cette methode seulement lorsque l'operation est laborieuse ; & au lieu de tante on se sert d'une canule.



CHAPITRE XIV.

Pratique du petit appareil pour les hommes.

LE petit appareil a pris son nom de ce qu'il faut peu d'instrumens pour le pratiquer ; il a esté inventé par Celse & décrit au Livre VII. Chapitre XXVI. comme on le pratiquoit autrefois , mais si la pierre n'est pas vers le col de la vessie , & qu'on la sente au pectinée proche & au dessous du scro-

DE LA LITHOTOMIE. 115
tum, la maniere de l'extraction en
est différente.

Pour en donner une forte idée,
voicy une observation de ce qui se
passa dans plusieurs Lithotomies de
l'année mil six cens quatre-vingt
à l'Hôpital de la Charité de Paris.
Quoy que j'eus ma part de celles
qui furent laborieuses, il suffira de
parler d'une qui échût à Monsieur
Jonnot dont les circonstances furent
semblables à d'autres operations
que je fis en sa presence. Ce re-
cit donnera lieu de faire deux es-
peces de petit appareil pour les
hommes.

On luy presenta un garçon de
sept ans qui avoit esté taillé l'an-
née precedente. Il ne fut pas be-
soin de se servir de la sonde pour
se rendre certain de la mala-
die, car avec deux doigts on sen-
tit une pierre vers le milieu du pe-
rinée beaucoup au dessus de l'en-

droit de la cicatrice.

Pour la tenir sujette , il estoit inutile d'introduire les doigts dans l'anús parce que la pierre estant trop haute on n'auroit pû la comprimer comme on fait , lorsqu'elle est au col de la vessie , mais après avoir fait relever le scrotum , & faisant tenir le cuir tendu , Monsieur Jonnot ayant tourné le dedans de la main gauche vers les bourses , il pressa la tumeur avec le poulce & l'indice aux deux costez du Raphé où il avoit remarqué la pierre , dans ce même temps il fit l'incision à costé du raphé sur la tumeur , & s'estant ouvert un passage il fit avec un crochet mediocre l'extraction de la pierre ; ensuite il sentit avec un doigt qu'il y en restoit d'autres , ce qui l'obligea de tenir la playe dilatée avec le même doigt introduisant le crochet , & afin que la pierre ne changeât point de place ,

il la tint sujette avec l'indice de la main gauche mise à la partie supérieure de la playe , & avec le pouce à l'inférieure : par ce moyen il acheva heureusement cette operation pour tailler le même malade au grand appareil ; car ayant tiré toutes les petites pierres & fragmens qui estoient au perinée , il introduisit par la verge une sonde canelée avec laquelle il connut qu'il y avoit une autre pierre dans la vessie , & sur cette sonde il continua l'incision avec les autres circonstances dont nous parlerons au grand appareil. Je fus obligé de faire la même chose à un garçon de vingt-deux ans.


Je me souviens qu'auparavant de se servir de la sonde pour le tailler au grand appareil , Monsieur Jonnot introduisit dans la verge un gros stilet droit pour faire descendre quelques fragmens qui estoient

situez un peu plus haut que l'incision , tandis qu'au dessous il comprimoit l'uretre , & ensuite le pouce estant mis au dessous de la playe il les tira sans peine avec une petite curette.

Cecy doit servir quand on tire la pierre du perinée , parce qu'en même temps il faut examiner s'il n'y en a point dans la vessie , & afin d'avoir moins de peine on peut introduire par la playe une sonde dont on se sert pour faire uriner les femmes. J'ay veu pratiquer cecy sur un fistuleux de la taille qui avoit une pierre dans la vessie , & après avoir retiré cette sonde , on luy fit l'operation au grand appareil.

Il n'est pas besoin de faire sauter le malade avant de le tailler au petit appareil , & après qu'il est situé , si c'est un petit garçon & que la pierre soit au col de la vessie





pendant que les serviteurs tiennent le malade , le Chirurgien trempe dans l'huile les doigts indice & du milieu dont les ongles doivent être rongez : si un doigt ne suffit pas il les introduit l'un après l'autre dans le fondement le plus avant qu'il peut pour les placer par delà la pierre , & pour la comprimer dans le col de la vessie entre le rectum & les os pubis , tandis qu'un serviteur relève le scrotum avec une main , & que de l'autre garnie d'une compresse il apuye sur le ventre pour faire descendre la pierre , ensuite le Chirurgien essuye le perinée , & il rend le cuir fort tendu avec les autres doigts , comme il est représenté par cette figure.


La tumeur que fait la pierre couverte des tegumens , donne de la facilité pour faire incision à côté du raphé , assez longue sur la pierre pour la tirer , évitant néanmoins

le rectum , les hemorroïdes & les bourses. Il ne faut pas craindre d'émousser le trenchant ny la pointe du bistori , car à chaque fois qu'on s'en veut servir il faut qu'il soit nouvellement repassé.

L'incision faite la pierre paroist, pour lors on quitte le bistori, & on prend le crochet, on le cache autant qu'on peut dans la main, le bout du manche vers l'auriculaire, & l'indice le long de son corps; sans oster les doigts du rectum on glisse le crochet entre le pubis & la pierre en cette façon.

Quand le crochet est derrière la pierre & qu'on la veut extraire, le manche doit estre dans la main, le bout appuyé contre le poulce afin d'avoir plus de force.

On ne doit point retirer les doigts de l'anús avant l'extraction, néanmoins quand la pierre se rompt acause de sa mollesse ou de sa figure qui est





qui est quelquefois courbée comme un croissant, si on ne peut tirer le reste avec le crochet ou avec une petite tenette, il n'y a qu'à retirer les doigts de l'anús & introduire le bouton dans la playe pour chercher la pierre, & l'ayant sentie, conduire sur le bouton une tenette pour la charger & la tirer doucement.

Par quelque appareil qu'on taille, quand la pierre se rompt, quoy qu'on ait extrait plusieurs pierres, il est toujours nécessaire d'introduire le bouton pour examiner s'il n'y a plus de fragmens.

Lorsque l'on taille les adultes au petit appareil, il n'est pas besoin de faire l'incision si haute qu'au grand appareil, parce qu'on incise justement sur la pierre, & il est aussi plus facile d'éviter la lésion du rectum.

Quand le malade a déjà esté tail-

lé on doit faire l'incision sur la cicatrice , ou sur la fistule.




CHAPITRE XV.

*Methode du petit & du grand
appareil pour les femmes.*

ON taille les femmes & les filles au petit appareil, leur introduisant les doigts indice & du milieu dans le vagina, si on le peut sans violence, ou dans le rectum pour sentir la pierre & la tenir sujette dans le temps que de l'autre main on pèse sur le bas-ventre afin de la faire descendre. On se sert ensuite de la sonde creuse droite qu'on fait tenir par un serviteur après que l'Operateur l'a introduite dans l'uretre & on en dilate l'orifice avec un dilatatoire simple con-

DE LA LITHOTOMIE. 125
vent fort heureusement d'un gor-
geret étroit qui sert de conducteur
aux tenettes. M. Jonnot ne se sert
que d'une sonde creuse droite , ou
d'un gros stilet pour conduire la te-
nette.



CHAPITRE XVI.

*Pratique du grand appareil pour les
hommes , & des circonstances dans
le temps de l'operation.*

JOannes de Romanis , Medecin
de Cremonne a inventé dès
l'année 1520. & a pratiqué dans
Rome le grand appareil qui a pris
ce nom , parce qu'il faut avoir plus
d'instrumens que pour les autres
methodes.

Les hommes que l'on taille au
grand appareil donnent plus de

peine tant pour l'opération que pour le pensément , parce que leur uretre est recourbée , longue , étroite , & que leur maniere de vie rend souvent cette partie sujette à beaucoup plus de maladies que celles des femmes.

Après que le malade est préparé , on le monte sur la chaise , ou bien on le fait coucher sur le bord d'un matelas posé sur le lit ou sur une table médiocrement haute , les fesses un peu élevées , la teste & le corps à demy-panchez en arriere appuyez sur le dos d'une chaise ordinaire renversée & garnie en sorte que les pieds de derriere soient proches les épaules du malade ; & afin qu'il demeure toujours en bonne situation , on se sert des écharpes ; les ayant mises toutes deux ensemble par leurs longueurs on les prend au milieu & les ayant nouées on les pose sur le col par

derriere la teste du malade. Si elles sont trop longues on fait un nœud & on laisse pendre par derriere une anne faite des écharpes mêmes. Cecy fait, le Maître prend les écharpes par le costé droit, & un serviteur par le costé gauche, puis ils se mettent tous deux devant le malade, & luy font poser les pieds contre eux : chaque costé des écharpes est double : le Maître & le serviteur chacun de son costé en fait passer un chef par devant sur les clavicules, & l'autre chef sur les omoplates, & ils les repassent tous deux sous les aisselles; là ils les tournent ensemble deux ou trois fois en les cordelant, ensuite on fait approcher les genoux du malade le plus que l'on peut vers son ventre, & dans ce temps on fait passer une des écharpes entre les cuisses & l'autre par dehors, & on les joint ensemble toutes deux par dessous en

les cordelant une fois, on fait pareillement approcher les talons du malade vers les fesses tandis qu'on engage la jambe de la même façon, après quoy on luy fait mettre quatre doigts d'une main sous le pied & le poulce au dessous de la malléole externe, comme s'il vouloit prendre son talon. Dans cette situation on luy engage les poignets & la main avec la jambe & le pied, observant de passer les chefs des écharpes par dessous le pied en forme d'étrier, & ensuite on les conduit entre les pieds & les poulces des mains, parce qu'il faut faire les ligatures médiocrement serrées, ce qui incommoderoit les poulces si on les engageoit, & de plus les violences que fait le malade pourroient contribuer à le blesser. En voicy la figure dans laquelle on n'a représenté qu'un serviteur pour appuyer sur le genoüil & le pied en





les écartant , & ſoutenant le malade afin qu'on puiſſe voir les circonvolutions ; car il doit y avoir un ſerviteur de l'autre coſté , & quelquefois deux de chaque coſté quand le malade eſt fort.

Cette poſture a quelque choſe qui peut augmenter la crainte du malade , & comme il ſe trouve des hommes qui ont une forte reſolution & le courage invincible , ſi ils ne vouloient pas ſouffrir ces ligatures ; il ſuffiroit de leur engager les cuifſes & les jambes par les circonvolutions décrites , & on leur feroit tenir les bras par deux perſonnes , ou bien ils aimeroient peut-eſtre mieux qu'on leur engageât les mains à part , leur faiſant mettre les poignets l'un ſur l'autre , & après avoir fait deux ou trois circonvolutions avec le milieu d'une bande & deux nœuds médiocrement ſerrez , on en feroit paſſer

les deux chefs sur le col & on y feroit un nœud coulant , observant que les mains du malade fussent situées environ le cartilage xiphoïde.

J'ay vû tailler chez M. Jonnot un Gentil-homme qui avoit eu la jambe coupée : on luy engagea le bras du même costé avec la cuisse, & il fut besoin de suppléer par le nombre de serviteurs afin de le tenir sujet. S'il avoit eu une ou deux cuisses coupées , on auroit pû s'en rendre maître par le nombre des personnes qui l'auroient tenu bras & moignons , en même temps qu'on auroit appuyé sur les épaules , sans se servir de ligatures.

Les femmes doivent estre situées de la même façon.

Pendant qu'on met les écharpes il est bon que le Chirurgien apostrophe quelquefois le malade , mais en peu de paroles , qu'il le

regarde & il peut l'encourager par ses discours , évitant tout ce qui est contre l'honnêteté , parce qu'il faut avoir une grande retenue pour obliger ceux qui sont presens de se taire , & d'avoir de l'attention & du respect , ce qui console merveilleusement un malade ; se souvenant que c'est insulter un affligé quand on rit de son mal , ou de quelque autre infirmité , ou de ses expressions. *Neminem riseris , ne miserum iriseris.*

Il vaut mieux qu'il y ait peu de personnes pour regarder , parce que le grand nombre peut incommoder l'Opérateur , étonner le malade , & mal interpréter les accidens qui accompagnent quelquefois l'opération : il est bon autant que l'on pourra qu'il y ait un Ecclésiastique pour parler de temps en temps au malade , cela peut aider à divertir la douleur & luy

augmenter la patience dans le temps de l'operation.

Quand le malade est situé , le Chirurgien fait placer son monde pour le soutenir & luy faire écarter les genoux , peser sur les épaules , & pour relever le scrotum ou tenir la sonde. Si un serviteur presente un bistori , il sera au costé droit de l'Operateur qui doit tailler avec la main droite , & il le tiendra de cette façon.



Main dans laquelle le trenchant du bistori est caché. L'Operateur doit , en le prenant , mettre sa main par dessus la chasie. Les autres serviteurs sont placez de même façon pour le petit que pour le

grand appareil ; mais ils tiennent différemment le malade comme on l'a représenté par les figures.

Quand il y a une hernie il faut élever beaucoup le scrotum , & prendre garde en incisant de blesser les testicules ou les parties qui causent la hernie.

Quelquefois avant l'opération le fondement tombe par l'effort du malade : si la sortie est considérable on peut tâcher de le faire rentrer sans violence , & ensuite poser une compresse sur l'anus qu'un serviteur comprime : mais si la main du serviteur embarrasse l'Opérateur, il ne faut rien mettre sur le rectum, car après l'opération on le réduit, & bien souvent il rentre de luy-même.

Si le malade a déjà esté taillé il faut faire l'incision sur la cicatrice ou sur la fistule , comme on a dit parlant du petit appareil. On peut

aussi bien tailler du costé droit que du costé gauche , prenant garde à ne pas couper le raphé parce qu'il se cicatrise plus difficilement, & que cependant plusieurs accidens surviennent.

On fait aux petits garçons l'incision du moins longue de deux travers de doigts ; aux hommes , longue de trois ou quatre travers de doigts ou environ , selon la grosseur que l'on croit que la pierre peut avoir , & selon l'épaisseur du sujet. Ce n'est pas qu'il faille la faire trop grande , car , lorsque la pierre est au passage , si l'incision estoit trop petite , on a recours à un coup de bistori , ou de ciseaux au lieu où il est nécessaire. On fait avec facilité l'incision de la peau & des membranes assez grande , mais souvent on n'ouvre pas assez l'uretre , à moins qu'on appuye fortement le bistori dans la

canelure ; on ne fait jamais l'incision au col de la vessie , mais toujours à l'uretre , & l'experience fait connoistre qu'une grande incision à cette operation est aussi-tost cicatrisée qu'une petite.

Le malade situé & engagé par les écharpes , on luy fait tenir les bras & les jambes par deux personnes robustes , & s'il est besoin deux autres ont soin de luy écarter les genoux. Un serviteur monte par derriere la chaise pour peser sur les épaules dans le temps de l'operation , que l'on fait si on peut au petit appareil , ou bien pour le grand appareil (qui est celuy dont on se sert ordinairement pour les hommes & pour les petits garçons) on introduit la sonde canelée , avec laquelle on cherche & on se rend certain de la pierre.

Si l'on ne sent rien avec la sonde canelée, il est nécessaire d'introduire

un cathéter dont le bec ne soit pas si long ; faisant évacuer l'urine , quand il y a une pierre , on la trouve plus facilement , parce qu'étant flottante petite & polie , elle suivra le courant de l'urine , & la sonde tournera mieux dans la vessie. Lorsqu'on aura senti la pierre , on introduira derechef la sonde canelée.

Quand le malade a esté taillé on a plus de peine d'introduire la sonde , & pour cet effet on en doit prendre une de la grosseur qui conviendrait à un sujet plus jeune , & longue suffisamment selon l'âge de celui qu'on doit sonder.

Il y a des Opérateurs qui tiennent la sonde en faisant l'incision : D'autres se la font tenir par un serviteur qui est placé au costé de la chaise opposé à l'aîne où l'Opérateur fait incision ; par exemple , le Chirurgien faisant son operation





au costé gauche du raphé, le serviteur sera du costé droit du malade, & après avoir essuyé le scrotum & le perinée, il relevera les bourses avec la main gauche, & de l'autre main il appuyera sur les anneaux & sur le bout de la sonde declinant un peu la canelure vers le costé gauche du malade, & il prendra garde de ne pas la faire sortir hors la vessie, ce qu'il évitera n'approchant pas trop les anneaux de la sonde vers le ventre. Le Chirurgien doit y avoir attention, luy recommandant qu'il tienne ferme & qu'il ne vacille point, faisant peser sur les épaules, parce que dans ce moment l'Operateur doit tirer le raphé vers le costé droit appuyant le pouce de la main gauche proche l'anus, & les autres doigts proche le scrotum. Après avoir senti avec l'indice droit, & remarqué l'endroit où le dos

de la sonde peut estre (de même qu'on fait pour sentir une veine avant la seignée) tirant toujours à droit le raphé , il prend avec la main droite le bistori monté , que le serviteur luy presente , il fait l'incision sur l'endroit designé , comme il est représenté par cette figure.

Il doit en incisant chercher la canelure de la sonde , dans laquelle il poussera la pointe du bistori , il appuyera fort, gratant en haut vers les bourses & en bas baissant un peu le poignet , afin que la pointe du bistori soit toujours dirigée dans la canelure par dessous la sonde pour couper exactement l'uretre , évitant le scrotum , le rectum & les hemorroïdes , ensuite il rendra le bistori , & il prendra le gorgeret pour l'introduire dans la canelure , après quoy il prendra avec la main gauche la sonde par le bout

où le serviteur la tenoit.

Pour éviter que dans le temps de l'incision les doigts de la main gauche de l'Operateur ne glissent, il peut se servir d'une compresse fort étroite, pour aider à comprimer & tirer le raphé vers le costé droit du malade.

Si l'Operateur tient luy-même la sonde en faisant l'incision, le serviteur qui étend le perinée peut pour la même raison, mettre entre la peau & ses doigts des compresses fort étroites, afin de tenir plus ferme les deux costez du raphé vers les cuisses; par ce moyen l'humidité n'empêchera pas d'apuyer autant qu'il sera nécessaire.

Monsieur Ruffin, Maître Chirurgien Juré à Paris, l'un des plus habiles de son temps, faisoit l'operation de cette maniere dans l'Hôpital de la Charité.


Après avoir introduit la sonde

& s'estre assuré de la pierre, il faisoit avec la main gauche relever les bourses par un serviteur qui étoit placé à costé droit du malade, & après avoir eslué les parties mouillées, le même serviteur ayant les mains presque ouvertes, il posoit la main droite sur le raphé le tirant à droit, & la peau à gauche avec l'autre main qu'il apuyoit vers l'aîne gauche, relevant les bourses avec les deux mains; l'Operateur penchoit un peu la sonde vers le ventre, & il apuyoit sur les anneaux avec la main gauche tandis qu'il designoit avec l'indice droit le lieu de l'incision; ensuite on luy presentoit le bistori, & dans le temps que le serviteur tenoit le perinée tendu à droit & à gauche sans se servir de petites compresses, il faisoit l'incision comme de l'autre maniere : voicy la figure.

La canchure de la sonde estant



Leçon de dissection




découverte & le bistori rendu , il prenoit un conducteur coudé vers le milieu qui est composé des deux à figure d'épée , il en pouffoit le bec dans la canelure sans quitter la sonde , & après qu'il estoit introduit dans la vessie il retiroit la sonde , & portoit sa tenette entre les branches du conducteur pour l'introduire dans la vessie ; le conducteur retiré il continuoit l'opération.

Ces deux manieres sont fort bonnes , & ont chacune leurs commoditez , parce que quand on tient soy-même la sonde on est assuré du lieu où elle est , mais aussi quelquefois après l'incision on a de la peine à trouver la canelure , acause que la graisse , les membranes & le sang la cachent ; il est vray qu'on peut après l'incision laisser dans la canelure la pointe du bistori , & le faire tenir par quelqu'un tandis que le

Chirurgien glisse le bec du gorgeret le long du bistori , mais quand un serviteur tient la sonde , après que l'incision est faite & que l'Opérateur a rendu le bistori comme on vient de décrire , il peut mettre l'ongle de son poulce gauche dans la playe , & ayant trouvé la canelure y pousser le gorgeret qui doit estre caché dans la main droite, en sorte que le doigt indice couvre sa longueur n'en faisant presque paroître que le bec : aussi-tost que le bec est dans la canelure , il prend la sonde par les anneaux avec la main gauche comme il est icy représenté.

C'est dans ce temps qu'il y a bien à prendre garde pour introduire le gorgeret dans la vessie , parce que si le malade pousse fort il peut faire sortir la sonde , & alors il survient de grands accidens ; car si on pousse le gorgeret & en-



July 1st 1891
Wednesday
The weather was very hot and sunny
and the water was very warm.




The water was very warm and the sun was very hot.
The beach was very sandy and the water was very blue.
The sky was very clear and the air was very fresh.

suite la tenette sans estre dans la vessie , il se fait un espace entre l'uretre & le rectum. Pour n'être pas trompé il faut avoir l'esprit attentif , ne point parler , & après avoir introduit le bec du gorgeret dans la canelure de la sonde, il faut les tenir fermes , faisant en sorte que le bec soit toujours dedans , & comme si on vouloit le conduisant en glissant le long & dessous la canelure , pousser le bec en haut ; par ce moyen on ne manque point à l'introduire dans la vessie ; & le tenant avec la main droite : il faut en tournant la sonde avec la gauche , la dégager du gorgeret & la retirer doucement de la verge. Une marque assurée que le gorgeret est dans la vessie , c'est la sortie de l'urine le long du conducteur ; mais il n'y en a pas toujours.

Quand le gorgeret est dans la


vesſie & que la ſonde eſt retirée , on le prend avec la main gauche , & de la droite une tenette convenable , que l'on pouſſe deſſus & le long du même gorgeret de cette façon.

Quoy qu'on aye introduit le gorgeret ou conducteur dans la veſſie , il en peut ſortir par l'eſſort du malade , ce qu'on evitera faiſant toujours peſer ſur ſes épaules , & le tenant ferme par les pieds & par les mains , ſans oublier que l'Opérateur , qui tient alors ſon gorgeret de la main gauche pour prendre une tenette avec la main droite , doit obſerver ſ'il ne ſort point de la longueur qu'il l'avoit introduit , car ſ'il s'aperçoit qu'il ſoit beaucoup hors l'incifion , il ne faut pas le pouſſer pour le faire rentrer comme auparavant , ny le retirer entierement , parce que peut-eſtre ne ſeroit-il pas hors la veſſie , &
ſ'il en










145

L

s'il en estoit hors on hasarderoit trop , acause que l'uretre & les autres parties s'estant rapprochées on feroit un espace entre la vessie & le rectum , comme on a déjà dit ; mais ayant pris une tenette mediocre plustost petite que grande , il l'introduira le long du conducteur , sans rien forcer , s'il sent de la resistance en poussant legerement , il faut retirer le conducteur : si il ne peut sans peine ouvrir la tenette , il doit estre seur qu'il n'est point dans la vessie , & pour lors, sans parler, il faut retirer la tenette , & tandis qu'on la lave dans l'eau tiede , & qu'on l'essuye , le Chirurgien prend le bouton avec la main droite , il releve s'il est besoin les bourses avec la gauche afin de pouvoir introduire dans la playe le bouton qui doit estre tourné du costé de la verge , le conduisant en haut vers la vessie de cette façon.

Le bouton qui est moullé ne blesse point les parties en s'ouvrant le passage, & lorsqu'il est dans la vessie (ce qui se connoit parce qu'on peut le tourner de tous les costez avec facilité) on cherche doucement la pierre par de petites secousses , & après l'avoir sentie , le Chirurgien prend le bouton avec la main gauche , & de la droite il conduit la tenette close par dessus le bouton jusques dans la vessie, voicy la figure.

Si c'est une tenette courbe , dans le temps qu'on l'introduit , le bec estant tourné du costé de la verge, on doit élever davantage les anneaux , comme on le peut observer dans cette figure dernière à la différence de celle de la page 144. qui représente la tenette droite conduite sur le gorgeret avec la main droite plus couchée sur la gauche. On se sert de la tenette





courbe quand on croit que la pierre est fort proche du penil , mais le plus souvent les droites suffisent , & tant les unes que les autres elles doivent estre posées sur la ligne du bouton , enforte qu'elle touche à deux côstez des prises.

Quand la tenette est dans la vessie , il faut d'abord l'ouvrir pour dilater le passage , puis ayant presque joint les anneaux , on la pousse de toutes parts doucement pour chercher la pierre. Pendant que la tenette est dans la vessie on ne rejoint plus les prises de peur d'offenser quelque partie , & pour lors on peut faire rapprocher médiocrement les cuisses du malade ne les tenant pas si écartées en continuant l'opération qu'elles estoient auparavant l'intromission de la sonde.

Il est à remarquer que toutes les fois qu'on veut changer de tenette

ou qu'on veut l'introduire , il est besoin de se servir du bouton , excepté immédiatement après l'incision faite quand on a introduit le conducteur sur lequel on pousse la tenette.

Souvenez - vous qu'après avoir fait l'incision , & que l'on a introduit le conducteur dans la canelure, lorsqu'on veut dégager la sonde ou qu'elle est hors la verge , le malade fait quelquefois effort avant que le conducteur soit dans la vessie ; ou bien lorsqu'on n'a pas assez coupé l'uretre vers la vessie , & qu'on ne pousse pas adroitement le bec du conducteur dans la canelure , au lieu d'entrer dans la vessie on fait une espace entre le rectum. Il faut pour lors retirer le conducteur ; & si l'on ne peut pas ensuite introduire le bouton , il est nécessaire de prendre la même sonde canelée , ou une un peu moins


grosse & canelée ; pour mieux l'introduire dans la vessie , on se servira de la seconde maniere de sonder les hommes , qu'on a décrit au chap. 9. page 76. Par ce moyen on introduit doucement la sonde dans l'uretre sans rien tourner , afin d'éviter que la sonde sorte par l'incision , & quand on l'a introduite dans la vessie , on cherche la canelure par la playe avec le bec du gorgeret pour continuer l'opération.

Quand le gorgeret est dans la vessie , si l'on craint que le passage ne soit pas assez ouvert , on prend un dilatatoire clos , & on le tient desorte qu'une branche de la poignée passe par dessus le poulce entre l'indice droit que le Chirurgien étendra le long du dilatatoire , mettant les trois autres doigts par dessous afin de le tenir ferme ; on l'introduit le long & par dessus le con-

ducteur , & sans le tourner aucunement on dilate en long , tant & si peu que l'on veut le fond de l'incision , faisant aprocher l'une de l'autre les branches de la poignée de cette maniere.

On s'en sert le moins que l'on peut ; si neanmoins la necessité le demande , on le met en usage , après quoy on le retire , & sans quitter le gorgeret , on prend une tenette cloise pour la conduire dans la vessie , & chercher la pierre , on la pousse par de petites secousses en tous sens, comme on a dit.

Il faut se souvenir aussi qu'on a dit que dés que la tenette est dans la vessie , on la pouvoit ouvrir mediocrement avec les deux mains pour dilater un peu le passage , & en même temps réjoindre presque les anneaux , & ensuite la pousser d'une main doucement à droit & à gauche , vers le haut & le bas où



130

L.

10



3

est le sphincter du rectum, pour sentir la pierre, tournant quelquefois la tenette en sorte qu'un de ses anneaux soit supérieur à l'autre, pour tâcher de prendre la pierre, qui pourroit estre platte, ou cachée à l'un des côtez de la vessie.

Quand on l'a trouvée il faut ouvrir avec les deux mains la tenette pour charger ce que l'on sent. On est quelquefois assez heureux de tenir la pierre bien chargée en peu de temps; ce que l'on connoist, parce qu'après que l'on a ouvert la tenette, l'on ne peut pas aprocher les anneaux l'un de l'autre, & on sent quelque chose de dur entre les prises : Ce signe est le plus certain, car des pierres fort petites peuvent estre chargées vers le milieu des tenettes où elles sont plus vontées qu'ailleurs; ce qui n'empêcheroit pas qu'on aprochât les

anneaux , mais on sent toujours une dureté. Cecy m'est arrivé , & on croyoit qu'il n'y avoit rien , mais je sentoie cette dureté entre la tenette Je garde la pierre de cette operatiõ.

Quand la pierre est prise il ne faut pas d'abord tirer à loy , mais il est besoin de donner doucement des demy-tours à la tenette à droit & à gauche , la tenant avec une ou deux mains , selon la commodité de l'Operateur , afin de connoistre si la pierre est bien chargée , & de la dégager d'entre les replis , tirant ensuite sans violence : on élève & on baisse alternativement les anneaux de la tenette , afin de faire mieux glisser la pierre. Si on s'estoit servy d'une tenette courbe , il faudroit que son bec fût tourné vers le pubis quand on est au passage pour sortir , & les anneaux fort proches de la verge : pour ne pas se tromper il seroit besoin de mettre quel-

que marque à un des anneaux de la tenette.

Quand la pierre est dans la tenette, il faut bien se donner garde de faire un tour entier, parce que si la pierre estoit grosse ou inégale, elle contondroit beaucoup les parties de la vessie. Si la pierre est molle elle s'écrase, & la tenette se ferme facilement; mais on sent comme un amas de sablon, & il ne faut pas approcher entièrement les anneaux, parce qu'on tireroit peu de gravier, & que l'on pourroit blesser les parties de la vessie. On retire la tenette avec ce qui est entre les prises; & on réitere la conduisant sur le bouton tant de fois, qu'on le juge à propos: & ensuite on introduit une canule, comme nous dirons au Chapitre suivant.

Quand on croit que la pierre est plate, & de figure d'amande, on peut tâcher à faire glisser une

des prises des tenettes par dessous, & l'autre par dessus; au lieu qu'ordinairement on prend les pierres lateralement; & quand elle est chargée on retourne la tenette, en sorte que le large de la pierre se rencontre selon la longueur de l'incision.

Quelquefois une pierre qui est de figure d'un gros œuf de poule, se trouve prise par les extremittez de sa longueur: ce que l'on peut conjecturer par le grand éloignement qu'on remarque entre les anneaux de la tenette, même on le voit quand la pierre est proche le passage. Pour conserver le sujet il faut en repoussant la tenette dans la vessie, relâcher un peu la pierre, & on ne manque pas de la faire tourner, par ce moyen on la comprime ensuite par les côtez de sa largeur, & on dilate moins le passage.

Si la pierre est fort adhérente, il vaut mieux en différer l'extraction,

parce que la suppuration contribue à la faire détacher. Et si l'Opérateur ne peut pas tenir la tenette assez ferme, il peut se servir d'une serviette pour envelopper les anneaux, afin que ses mains ne glissent pas.

Lors qu'elle est excessivement grosse, il vaut mieux la laisser que d'exposer manifestement un malade à la mort, sur tout si l'âge & d'autres circonstances sont contraires à l'opération. Paré & Beverovicus, conseillent de la rompre avec des tenettes dont les prises ressemblent à de grandes dents de fies: Et Tevenin propose au Chap. 121. de ses Operations, d'introduire une canule assez longue pour empêcher que la pierre ne tombe sur le sphincter, afin que le malade puisse uriner. Cette canule doit fermer à vis pour s'en servir au besoin.

Lors que dans l'opération on a

tiré toutes les pierres, il n'est pas besoin d'introduire une canule : Il y a néanmoins des Operateurs qui en mettent toujours, pour vuidet, disent-ils, les caillots de sang ; mais ils se liquefient & sortent par la verge, ou par la playe, sans canule, qui empêche de soy la reunion des parties divisées, & encore sanglantes. Il est vray que ceux qui entendent bien la conduite de cette operation peuvent y reussir, n'y laissant pas long-temps la canule : Et il est même necessaire de s'en servir quelques jours lors qu'il y a ulcers à la vessie, pour y faire injection plus commodément.





CHAPITRE XVII.

*Du temps qu'on peut tenir le malade
dans l'operation, & ce qu'il
faut faire quand elle est
laborieuse.*


ON appelle l'Operation laborieuse quand elle n'est pas faite en peu de temps par un homme habile. Alors on ne doit pas travailler le malade jusques à ce qu'on ait tiré la pierre, ou toutes ses parties. Elle occupe quelquefois tellement le passage, que le conducteur ou la tenette, n'y peuvent entrer qu'avec grande peine: Pour ce sujet un Chirurgien expert ne fera point difficulté de retirer les instrumens, & avec un doigt, ou le bouton, il repoussera la pierre dans la

vesſie , & enfuite il ſe ſervira du bouton & de la tenette pour continuer l'operation.

Il arrive ſouvent qu'après avoir chargé pluſieurs fois la pierre elle échappe & remonte, parce que la tenette ſe fauſſe , ou que les priſes n'en ſont pas bonnes , ou bien la pierre eſt monſtrueuſe , en égard au paſſage , ou elle ſe brife quand on la tient trop ſerrée , ou parce qu'elle eſt molle , & qu'on ne peut pas l'extraire facilement quand elle eſt adhérente.

Ces circonſtances doivent eſtre obſervées fort exactement , & le Chirurgien ne doit pas eſtre plus attentif à ſon operation qu'à conſiderer les forces & l'âge du malade, avec le temps qu'il eſt expoſé ſur la chaiſe , le tenant dans l'operation plutôt moins que trop long-temps, de peur qu'il ne ſoit ſurpris par la mort , ſi on le travailloit juſques à






l'excès : Mais si après avoir conduit l'opération methodiquement, il ne tiroit aucune chose parce qu'il n'y auroit rien dans la vessie, ou que la pierre seroit petite, ou s'il restoit des fragmens, il peut prendre le bouton à curette par sa partie moyenne, & introduire la cuiller dans la playe, pour tâcher d'extraire quelque chose; & après avoir reiteré deux ou trois fois, il doit se servir d'une canule proportionnée au sujet, montée selon l'Art. Pour l'introduire il se servira s'il veut, & avec plus de seureté du bouton mis dans l'incision, & ayant trempé dans l'huile le bout de la canule, il la conduira le long du bouton jusque dans la vessie de cette maniere.

Les chefs de la languette de la canule peuvent estre attachez à la ceinture qu'on fait avec le bandage, un pardevant & l'autre par derrie-

re : ou bien on conduit un chef le long de chaque aîne du malade, & on les laisse sur le pubis. Le lendemain, ou quelques jours après, on oste la canule, & s'il y a encore quelque chose dans la vessie, on tâche avec le crochet, ou la cuillère du bouton, ou avec la tenette conduite par le bouton, d'extraire la pierre lors que le malade est couché dans son lit, ou bien on le fait derechef situer sur la chaise comme la première fois, sans néanmoins se servir des écharpes, parce que le malade est affoibli, & qu'il auroit trop d'étonnement.

Quand les fragmens sont mediocres, on peut les tirer dans le lit, & il est bon de laisser la canule quelques à ce qu'on soit assuré qu'il n'y en reste plus : Ce que l'on connoîtra remarquant ce qui est sorti dans le temps de l'operation, & depuis avec les medicamens des appareils.

On peut même, après avoir retiré la canule, introduire une sonde courbe par le bout, ou un gros stilet dans la cavité de la canule sans la retirer; & par plusieurs petites secousses chercher le plus avant que l'on pourra sans douleur. On peut aussi se servir du duvet d'une plume pour ôter de la canule les grumeaux, ou les glaires & matieres purulentes qui se forment dans la vessie. L'injection d'eau d'orge tie-de y convient, & après les premiers jours on peut comprimer mediocrement le ventre avec la main dans le temps du pensément.



CHAPITRE XVIII.

Des symptomes de la Lithotomie.

LEs symptomes de la Lithotomie se divisent en ceux qui ac-

compagnent l'operation , & en ceux qui la suivent. Les premiers sont nommez concomitans , & les autres subsequens.

Les accidens qui accompagnent l'operation sont l'hémorrhagie, la longueur du temps qui la fait nommer laborieuse , la brisure de la pierre, la difficulté de la tirer , ou l'impossibilité , le nombre & les fragmens, qui ne peuvent pas estre tirez à cause de leur grosseur , quantité, ou debilité du sujet : Quelquefois même on ne trouve rien , quoy qu'on ait sondé & examiné auparavant le malade. La contusion survient si on pousse trop rudement & trop frequemment la tenette quand elle est dans la vessie , l'excoriation , ou même la ruption de la vessie , ou d'autres parties , tant par la grosseur & les âpretez de la pierre, que par les prises des tenettes , si on les ferme exactement lors qu'elles

sont dans la vessie , parce qu'elle se ride, & que les côtes de son corps, ou son fond , peuvent estre pris sans la pierre, ou avec la pierre.

Les symptômes qui suivent l'operation dans la cure de la Lithotomie, sont tension douloureuse du ventre , la retention d'urine , l'insomnie , l'inflammation aux parties affligées , les trenchées de ventre, diarrhée , vers , ecchymose , fluxion, abcès , excoriation , prurit & pourriture , ulcere au scrotum , & aux parties circonvoisines , ulcere & pourriture des parties de la vessie; trop grande suppuration , ou trop long-temps ; sortie du pus par la playe , ou par la verge avec l'urine, fièvre , marasme universel, ou particulier , hemorrhagie comme dans le temps de l'operation , syncope, convulsion , vomissement , delire & les frissons.

La tension douloureuse du ven-

tre est causée par inflammation, qui attire fluxion, parce que les ligamens qui suspendent la vessie, & les autres parties où elle est adhérente, ont souffert violence. La fièvre & l'insomnie tirent leur origine, de l'intempérie des parties principales, agitées par les passions de l'ame; & l'hémorragie par l'incision, ou l'érosion des vaisseaux: la retention d'urine arrive par le sang coagulé, ou par inflammation des parties dans le temps de la suppuration, ou par une petite pierre descendue des reins, ou par un fragment resté après l'opération: l'inflammation vient par un mouvement circulaire des parties humorales; les trenchées, le cours de ventre, & les vers aux enfans par l'abondance du flegme; l'ecchymose est l'effet du sang extravasé; l'abcès est produit par le séjour & l'amas des humeurs dans l'interstice des parties: la trop gran-

de & trop longue suppuration , par la quantité des matieres humorales dont l'abcés est formé ou par les reins ulcerez , & par la fonte des humeurs de tout le corps, dont une partie suppure lors que le reste se dissipe par transpiration , ou par le cours de ventre , & cause en même temps , le marasme, dit amaigrissement de tout le corps : l'ulcere de la vessie est causée par contusion & suppuration de ses parties , ce qui excite la sortie du pus par la verge ou par la playe : les chairs fongueuses par une superfluité de sang mal élaboré & trop sereux ; le prurit & l'excoriation sont des effets de l'acrimonie de l'urine , ou du bandage trop serré : la pourriture de l'ulcere vient de la corruption des humeurs & de l'air, ou de la trop grande humidité des medicamens, & la virulence par l'acrimonie des humeurs & des remedes : le vomis-

sement survient après l'opération, parce que plusieurs fibres nerveux du sixième pair se distribuënt au ventricule. Il y a d'autres accidens par la distribution des nerfs, qui sortent par les trous de l'os sacrum communs aux sphincters de la vessie & de l'anüs, qui ont esté contus ou lacerez par les tenettes, ou par les âpretez d'une grosse pierre, principalement lors que l'opération a esté laborieuse.

La lypothimie, ou syncope, est causée par grande hémorragie, & par dissipation des esprits: La convulsion arrive par les vomissemens, la diarrhée & l'hémorragie, qui empêchent que les nerfs ne reçoivent une assez grande quantité d'esprits: le delire & alienation d'esprit, surviennent lors que la dissipation des esprits animaux est si grande, que le cerveau n'en a pas suffisamment pour luy, ny pour en fournir conti-

nuellement à tout le corps , afin que les parties puissent faire leurs fonctions. Enfin le destin termine tous les accidens par la destruction de la machine ; c'est à dire , par l'abolition du mouvement dans l'instant de la separation de l'ame d'avec le corps.

Si quelqu'un est surpris de ce que nous n'avons rien dit de la douleur, il peut faire reflexion que c'est un symptome , ou plutôt une propriété essentielle de toutes les maladies des parties qui sont capables de sentiment , puis qu'elle est toujours où il y a intemperie avec solution de continuité des parties molles , & que par consequent elle se rencontre dans la Lithotomie plutôt que tous les autres accidens dont on vient de parler.


Ces symptomes ont leurs causes, leurs signes diagnostics , & prognostics : les uns sont les causes & les

signes des autres , & tous les symptômes en general sont causez par la douleur , la crainte , l'hémorragie , la contusion , & la dilaceration des parties. Les prognostics se tirent du temps , de la violence , & selon le sujet où les accidens paroissent. Les symptômes qui se manifestent d'abord ne sont pas si dangereux , & ceux qui durent long-temps , ou dans un corps cacochyme , sont plus à craindre.

Un Operateur évitera plusieurs symptômes concomitans étant assez expert pour bien pratiquer l'opération. Il y a des coureurs qui ont l'adresse de feindre qu'ils ont tiré une pierre , & la supposent, quoy qu'ils n'ayent rien trouvé.

Les symptômes qui surviennent après l'opération, sont corrigez chacun en particulier , ou plusieurs ensemble selon leur nature , par différens remèdes. Le premier soin est d'appaiser

d'appaiser la douleur par les embrocations & fomentations : l'hémorragie est souvent à craindre, on doit se servir de topiques astringens pour conserver le trésor de la vie. La perte du sang cesse ordinairement par la foiblesse du malade, parce que les remèdes qu'on applique sur cette partie sont dissous par l'urine ; & outre qu'on ne peut se servir d'autre bandage que du contentif , à la différence des autres parties où l'on pourroit mettre le doigt sur l'ouverture du vaisseau , ou le couper entièrement , y appliquer le bouton , la ligature , les plumaceaux , & comprimer. On observe de laisser le premier appareil pendant vingt-quatre heures tout au plus : on le leve doucement , laissant un plumaceau sur le lieu d'où sort le sang , si on a pû le reconnoître ; & si l'hémorragie revient , on a encore recours aux astringens.



CHAPITRE XIX.

*De la methode pour le pensement des
taillez , contre leurs symptomes.*

NOus entrons insensiblement dans la curation de la Lithotomie , dont le traitement est general ou particulier. Après avoir parlé des causes, especes, signes & pronostics des symptomes , il est à propos de donner une idée des choses qui doivent estre observées depuis l'operation jusques à la guerison du malade. Par ce moyen on pourra traiter en particulier des remedes contre les accidens ; puis qu'ils arrivent dans le temps, que le malade est entre les mains du Chirurgien.

Par la cure generale de la Litho-

tomie on entend celle où il n'y a point de symptomes qui prennent nature de cause ; & par la curation particuliere , celle qui est accompagnée d'accidens si fâcheux , qu'ils obligent de changer de methode : on parlera de chacune en particulier.

Supposons que le Chirurgien ait conduit son operation heureusement , il faut penser la playe , & par le secours des remedes tâcher de la guerir.

La premiere chose qui doit être observée après l'operation , pendant que le taillé est encore en situation , & qu'on luy oste promptement les écharpes, si on s'en est servy , c'est de mettre sur l'incision une compresse carrée , sèche, grande de trois ou quatre travers de doigts mediocrement épaisse , & la tenant d'une main , prendre le malade par le corps , & se faire

aider pour le porter dans le lit

Nous avons dit qu'on peut mettre le colier avant l'operation: après on prend la fronde proportionnée au malade , on la pose sous le dos audeffus des fesses , afin que les deux chefs dits congeneres, & qu'on peut dans ce temps nommer supérieurs, puissent servir de ceinture, observant que le corps ou milieu du bandage decline vers le costé où l'incision a esté faite, ce qui empêche qu'on ne bouche l'anüs.

Auparavant de nouer les deux chefs supérieurs de la fronde pour en faire une ceinture , il faut faire l'embrocation sur le ventre & sur les bourses avec de l'huile Rosat, ou de Camomille tiede; pour prevenir la tension douloureuse du ventre , & pour la guerir, & on mettra sur le ventre une emplâtre astringente, la ventriere de même

grandeur imbuë d'Oxycrat tiede ; alors il faut prendre les deux chefs superieurs de la fronde , en passer un dans le colier , & les noïer vers le costé droit du malade.

On met ensuite les medicamens sur la playe , après en avoir osté la compresse qu'on avoit mise sèche , & qui est abreuvée de sang depuis l'operation faite. Si il y a hemorrhagie , on se sert de poudres astringentes & de plumaceaux ; Et quand il n'y a point d'hemorragie , l'on met sur la playe un plumaceau mediocrement épais couvert d'astringent , une emplâtre à queue couverte d'astringent , & on releve les bourses avec la troussé conduisant ses extremitéz aux deux aînes , & après on met sur l'emplâtre une petite compresse carrée mouillée d'Oxycrat tiede comme la troussé , tenant tout l'appareil de la playe avec une main (il

fait être Ambidextre) & de l'autre on prend entre les cuisses le bandage par le chef qui est proche l'anus ; on le fait passer par-dessus la petite compresse carrée qui est sur la playe , & on le conduit le long de l'aîne gauche , declinant entre la cuisse & la main qui tient l'appareil , & on laisse ce chef sur la ceinture , tenant toujours l'appareil : Après il faut prendre l'autre chef qui est le plus éloigné de l'anus , on en fait un renversé en dehors vers le corps du bandage pour comprimer également ; & le conduisant aussi par-dessus la compresse carrée qui est sur la playe , en dégagant les doigts dont on la tient , on le fait passer le long de l'aîne droite comprimant fort légèrement : Alors on ôte la main qui tenoit l'appareil , & avec l'aide des deux mains on fait passer ce dernier chef par-des-

sous la ceinture en devant & du côté droit , pour en faire le lac (dit Nautonnier) ; on en fait de même à l'autre chef au côté gauche ; ou bien si ces deux chefs sont assez longs ; après les avoir passés par-dessous la ceinture , on les noue ensemble dans le colier vers le côté gauche. Dans tout le temps qu'on se sert du bandage il faut mettre une ventrière au malade , & regarder si les chefs du bandage tiennent l'appareil de la playe ; car il ne faut pas que le corps du bandage descende plus bas que la fesse gauche : Ensuite on tient les cuisses sujettes & médiocrement éloignées l'une de l'autre avec la jarretière enlascée au-dessous des genoux comme un Kiasse , faisant le nœud extérieurement aux cuisses.

Quand c'est une femme qui a esté taillée , on met l'appareil sur le ventre comme aux hommes , &

le plumaceau couvert d'astringent sur l'orifice de l'uretre avec une emplâtre , une compresse , & la fronde ou Té double , dont on fait une ceinture comme avec la fronde , & les autres chefs qui font les queues du Té , estans passez entre les cuisses , & se croisans sur l'appareil , le tiennent & le pressent si peu qu'on veut. Quand la malade veut uriner , il faut lever le bandage ; elles ne sont pas sujettes à tant d'accidens , & elles sont plutôt gueries que les hommes.

On peut lever le premier appareil des hommes douze heures après l'application , reiterant l'embrocation , avec le même astringent & la même ventriere , au moins pendant quatre ou cinq jours , ou davantage , si le ventre est tumefié ou douloureux , on se sert aussi de fomentations avec le gros Vin & les Roses de Provins

sur le ventre , & on les reïtere quelque temps quatre ou cinq fois par jour.

On pense la playe avec le Baûme d'Arceus à demy fondu , pour le faire mieux penetrer , avec le doigt ou le duvet d'une plume à écrire introduite jusqu'au fond de la playe le plus legerement qu'on peut : Ensuite on applique sur les lèvres un petit plumaceau plat trempé dans le même Baûme , & l'emplâtre à queue imbibée d'huile rosat tiede , se servant d'une compresse , & d'une trouffe mouillée d'Oxycrat tiede , & d'une fronde blanche & sèche , qui seront changées à chaque levée d'appareil comme la premiere fois ; & les jours suivans on continuë le pensément deux fois en vingt-quatre heures , changeant les malades exactement d'appareils , excepté celui du ventre qui peut servir

pendant les premiers jours , & de temps en temps on met les malades à sec ; ce que l'on observe dans le temps qu'on les pense , fans oublier de les nettoyer , pour éviter la gangrene. Le pansement se doit faire fort promptement ; tenant la playe découverte le moins qu'on peut , observant d'avoir du feu pour corriger l'intemperie de l'air.

Après quatre ou cinq jours on ne se sert plus d'Oxycrat , ny d'astringent , ny d'emplâtre à queuë , mais on met seulement une ventrière sèche ; & dans l'incision trois ou quatre gouttes de baûme d'Arceus avec le duvet d'une plume ou avec le doigt , & un plumaceau plat sur les lèvres de la playe. Le Baûme du Perou , & de Kopati , qu'on nomme Baûme blanc naturel , sont souverains pour l'agglutination ; celui de Kopati est excel-

lent depuis le commencement jusques à la fin. Quelques-uns prennent parties égales de Baûme d'Arceus, & d'huile d'œuf, d'autres se servent de Baûme d'Arceus pendant toute la curation, d'autres du Kopâû; il y en a qui font un mélange de parties égales de Basili-cum, & de Therebentine de Venise, & d'huile d'œuf, ou de Baûme d'Arceus, & on réussit également, pourvû que l'operation ait esté heureuse, & qu'il n'y survienne point d'accidens.

Sur ces sortes de remèdes on met un petit plumaceau, & une emplâtre de Diacalciteos un peu plus longue que la playe, & large à proportion du sujet, une trouffe sèche pour relever les bourses, une compresse, & le bandage sur la playe comme on a dit cy-dessus, le comprimant un peu plus que dans le commencement: On

se sert de la jarretiere jusques à la guerison. Les premiers jours passez il est bon de dire au malade , qu'il appuye mediocrement la main sur l'appareil , pour mieux pisser en même temps dans son urinal.

Quoyque la playe demande de soy la reünion , il est bon de prendre garde que les lèvres & les tegumens ne se recourbent point en dedans ; & après quelques jours , quand le terme de la fluxion est passé ; ou qu'elle n'est point survenue , on fait ensorte avec l'aide de petites compresses fort étroites , que les lèvres soient également élevées , & un peu éloignées à l'orifice de l'incision seulement ; pour cet effet il faut mettre plusieurs compresses proche la lèvre qui est du côté de la cuisse gauche ; afin que le fond s'incarne avant que la cicatrice se fasse. Après qu'on est assuré du fond , on se sert de re-

medes delicatifs sur un petit plumaceau , & de plusieurs compres-
ses inégalement épaisses & medio-
crement étroites . une à chaque cô-
té , & une emplâtre pour les cou-
vrir , & par dessus une autre petite
compresse transversalement à la
partie supérieure de la playe , &
sur ces trois, deux autres inégale-
ment larges , pour tenir plus fer-
me par le moyen du bandage. S'il
s'y forme des chairs fongueuses ,
on les consommera avec l'alun cal-
ciné , ou avec la pierre infernale.

Il y a des taillez qui guerissent
par le bon temperament en huit ,
quinze , ou vingt jours ; le terme
ordinaire de la curation de la Li-
thotomie est de trente ou quaran-
te jours.

La prudence du Chirurgien est
d'observer les changemens qui sur-
viennent au malade , pour con-
noître les symptomes fâcheux,

dont nous avons parlé , qui changent la cure générale , & qui obligent de les prévenir , ou de les corriger par une méthode particulière & contraire à leur nature.

On y réussit par la diette , par la Chirurgie , & par les remèdes : la diette , jusqu'au septième ou huitième jour , consiste à éviter le Vin , à moins que le malade ne soit fort débile ; il faut user de tisane faite de racines de corne de Cerf , & d'ivoire , ou avec un peu de graine de lin , & les racines de mauves & de guymauves , ou à tout le moins , au besoin , il boira de l'eau ferrée , ou de la teinture de roses rouges , ne le faisant pas boire selon sa soif , mais un peu moins de peur du cours de ventre ; il suffit qu'il prenne cinq ou six bouillons en vingt-quatre heures , & fort peu d'œufs ; la saignée & les clystères rafraîchis-

sans & anodins, s'il y a fièvre, & douleur au bas ventre, le tout selon l'avis du Medecin : Et après que les sept ou huit premiers jours sont passez, & que les accidens ont cessé, on augmente la nourriture, commençant par de petits potages, ou des panades, ensuite un peu de viande, & le pain, après l'avoir purgé, ce qui arrive environ le quatorze ou quinzième jour après l'opération.

La Chirurgie est nécessaire, quand il faut reïterer les saignées, ouvrir les abcez & leurs sinus, scarifier les lieux où il y a disposition à pourriture; quelquefois on se servira de ciseaux, pour détacher les membranes & autres parties entièrement corrompuës, on change de remedes pour resoudre les tumeurs & meurir les abcez; on mondifie les ulceres du scrotum & de la vessie par injections & autres

medicamens qui résistent à l'ambulation & à la pourriture. Les symptômes extraordinaires paroissent les uns auparavant les autres , ou plusieurs ensemble qui font la complication ; nous devons parler de la correction de chacun en particulier.

On a dit que la douleur s'appaisoit par l'oxyrhodin sur le ventre , sur les aînes , & sur les bourses ; l'hémorragie par les astringens ; la fièvre par petites saignées, sur tout si le malade n'a pas beaucoup perdu de sang dans le temps de l'opération , ou après , & qu'il aye des forces : l'insomnie est combattue par les Apozèmes rafraîchissans , les émulsions , & les somnifères après les premiers jours ; l'inflammation des parties , après la suppuration , s'éteint par le cerat de Galien ou par le nutritum. Les fragmens & les petites pierres sor-

rent avec l'urine , & par l'injection d'eau d'orge tiede , ou elles sont tirées avec le crochet , la curette , la tenette , ou par la cuillere du bouton. On remédie à la retention d'urine qui presse trop , par l'intromission de la sonde à femme dans la playe , & ensuite par une canule qu'on y laisse pendant quelques jours ; les trenchées & le cours de ventre s'arrestent par les clysteres anodins & carminatifs , & par les juleps de Pavot rouge , huile d'amandes douce , l'eau de plantin , & par la gelée de corne de cerf : on fait vuider les vers & la matiere venimeuse cause de leur generation , par les medecines & autres remedes qui aident à la digestion , comme ceux où entre la rheubarbe , absinthe tamarins , aquila alba en petite quantité , &c. l'échimo-
se , la fluxion , & les tumeurs mediocres se dissipent par les résolu-

tifs & emplâtres fondantes , par les cataplasmes confortatifs & anodins , selon les degrez du mal & les regles de l'Art , observant d'y mettre plus de confortatifs que de simples émollients & resolutifs , à cause de l'humidité de la partie ; les abscez se forment ordinairement au-dessus de l'incision de la Lithotomie , & souvent en pressant d'un doigt sur la tumeur & deux autres aux côtez , l'évacuation du pus se fait par l'ulcere ; mais si on connoist que la peau soit fort dénuée , la matiere prochaine avec inondation , il faut les ouvrir jusques au fond du sinus , & on continuë la cure de l'ulcere selon l'Art. On se sert d'injections deterfives pour mondifier la vessie , & on fait prendre des émulsions aux malades , afin que le pus s'évacuë plus facilement avec les urines.

Les excoriation & le prurit sont gueris par le nutritum , l'album rasis, le cerat de Galien , le pourpholix dissous dans l'huile rosat , & autres dessicatifs anodins , observant de ne pas comprimer le bandage pendant quelques jours ; & si les excoriation & le prurit occupoient beaucoup de place , on pourroit penser pendant quelque temps le malade sans luy mettre de fronde , mais seulement sur les medicamens du lieu où a esté faite l'operation , l'emplâtre à queue couverte de remedes convenables ; se servant toujourn de la jarretiere , pour approcher mediocrement les cuisses l'une de l'autre . La mesme chose se pratique lors que le scrotum ou les testicules sont fort tumefiez & douloureux , & on se sert en cette occasion de cataplämes anodins , émollients , &c. étendus sur des drapeaux taillez de la figu-

re qu'on appelle l'emplâtre à scrotum , & le bandage est une espece de suspensoir , que l'on applique comme pour les autres maladies des bourles ou des testicules.

Les taillez ne sont pas exemts des autres accidens quand ils sont long-temps couchez sur le dos ; on y doit remedier selon les especes & leurs degrez , & après qu'ils sont diminuez on se sert de bandages ordinaires , qui sont la fronde ou le Té double, qui convient mieux à la fin qu'au commencement, parce qu'il comprime plus facilement, & on s'en sert plus ordinairement aux femmes qu'aux hommes : pour s'en servir il faut mettre la ceinture autour du corps du malade , & après en avoir passé un chef par dedans le colier , & avoir noué les deux chefs , on prend entre les cuisses un des chefs de la queue du Té , & le faisant passer oblique-

ment sur l'appareil , on l'attache à la ceinture au côté opposé à celui d'où on l'a pris , on fait la même chose à l'autre chef , les engageant par une espece de lac , dit Nautonnier , observant de ne pas boucher l'anüs.

La syncope , la convulsion , & le vomissement se tiennent souvent compagnie , mais le dernier paroist plus frequemment que les autres ; on y remédie par le Vin , par les potions cordiales faites de Theriaque , confection d'hyacinthe , Alkermes , les corraux , perles préparées , poudre de vipere , syrop de grenades , dans les eaux de melisse , scorzonere ; chardon benit , oxytriphyllon , selon les différentes indications , on choisira & on déterminera la doze de ces remedes par le conseil du Medecin , les faisant prendre en petite quan-

tité souvent répétée , à cause de la débilité du ventricule.

Lorsque le vomissement est arrêté , la convulsion cesse , & la syncope par les alimens succulens, comme bonne gelée , consommé , & œufs frais , lorsqu'ils sont retenus dans le corps , en fortifiant le malade : la raison en est évidente, puisque la cause de ces deux symptômes est l'inanition , & que les esprits animaux estans en petite quantité , picotent les nerfs , qui se retirent vers leur principe.

La playe se salit quelquefois , & par la trop grande suppuration , selon Guy de Chauliac , on connoît qu'elle degénere en ulcère fordide , & le plus souvent virulent , à cause de l'acrimonie de l'urine , & des humeurs qui s'irritent , & deviennent mordicantes. Ces sortes d'ulcères ne sont jamais sans inflammation , prurit , exco-

riation à la partie : Pour ces accidens il faut se servir de remèdes diversifs , refrenans & locaux , appliquez selon le temperament de la partie , & le conseil du mesme Auteur , au Chapitre des playes avec hemorragie : Quand il y a plusieurs symptomes qui paroissent ensemble , on doit observer la même regle , & avoir attention à l'ordre , à l'urgent , & à la cause , & sur tout à ce qui est de plus urgent ; ayant entr'autres choses grand soin de remarquer les effets des remèdes locaux , où consiste le plus la Chirurgie.

Pour remedier au delire , on donne des consommez , des précis faits avec veau , poule , perdrix , coupées menu ; & mis dans un pot de terre vernissé , sans eau , bien luté , digérés au bain - Marie , des Cardiaques , ou des alimens remplis de suc , & faciles à

estre digerez , pour reparer promptement l'inanition , & temperer les esprits animaux. Il est vray que le delire avec la froideur des extremittez sont si proches l'un de l'autre , qu'on les peut mettre au même rang , & que le delire après la Lithotomie , est comme le dernier degré de la maladie , l'effort de la Nature , & l'avancoureur de la Mort.



CHAPITRE XX.

*De l'Ischurie , ou suppression
d'urine.*

LA vessie est une partie membraneuse , qui peut s'agrandir par la quantité des choses contenues , & lors qu'elle en est remplie ou picottée , ce qui est renfermé

fermé ouvre le sphincter pour s'écouler dans l'uretre.

Quand tout est dans son état naturel , l'homme ne souffre aucune incommodité , parce que l'évacuation des choses contenuës se fait de temps en temps , mais le sang caillé , ou le pus coagulé , la ~~la~~ semence condensée, une pierre, un corps fongueux , des humeurs grossieres , ou le flegme avec du sable , une ou plusieurs vertebres , inferieures luxées , les excremens fecaux endurcis , l'enfant mort au ventre de la mere , la carnosité , & la callosité boûchent quelquefois le sphincter de la vessie , ou un endroit de l'uretre. Il en est de même lorsqu'une humeur visqueuse cause l'engourdissement de la vessie , ou que le malade est dans un assoupissement : ce qui se fait par diversion de sentiment , ou par transport au cerveau , ou par

la convulsion du nerf qui va de l'os sacrum au sphincter de la vessie , & par les fièvres malignes.

Outre le nombre de ces causes de la suppression d'urine , on doit reconnoître l'affaîssement ou flaccidité de l'uretre , à quoy les vieillards sont sujets; la compression du col de la vessie causée par la chute , ou par l'inflammation de la matrice , ou des prostates & parastates , des hemorroïdes internes , ou par une grande quantité d'urine qui étend fort les fibres de la vessie , comme il est raporté dans Paré L. XVII. d'un jeune homme qui ayant retenu trop long-temps son urine , tomba dans une suppression sans avoir de pierre , & qui fut guery par la sonde. Fabrit. Hild. dit L. de Lith. C. 3. col. 1. que cét excellent Mathematicien Tyco-brahé estoit à Prague dans une grande assemblée , où ayant été

contraint de retenir fort long-tems son urine , il tomba dans une suppression si violente , qu'il fut impossible de le guerir , & dont il mourut.

La retention d'urine de telle cause que ce soit , produit une douleur violente , & une inflammation insupportable à toutes les parties voisines de la vessie , d'où la suppression arrive , parce que l'urine ne sort point , & que sa quantité augmente continuellement. Les malades ont pour lors une chaleur universelle , rougeur aux yeux , la face ardente , oppression , inquiétude , fièvre , une tumeur douloureuse , dure , & fort large au-dessus du pubis ; les vomissemens bilieux , & tous ces fâcheux symptômes les reduisent à un estat où ils n'attendent que la mort , s'ils ne sont promptement secourus. Le Chirurgien connoistra que c'est

un grumeau de sang qui est cause de la suppression, si le malade a esté depuis peu bleffé aux reins, ou qu'il ait pissé du sang; si une ulcere au reins a precedé, & que le malade ait rendu des urines purulentes, son observation fera conjecturer que c'est un amas de pus épais & visqueux: Si les signes de la pierre ont paru, il le fera connoître aux assistans, il fera le discernement du fungus par la sonde, à moins que la pierre ne fût couverte d'un Kiste; il connoîtra que c'est une carnosité; ou une callosité, par le moyen de la sonde, ou des bougies. Je ne dis rien de la maniere de vivre du malade, dont les excez ont pû estre la cause des humeurs âcres, ou d'une grande inflammation: je ne parle point non plus des autres causes qui se manifestent d'elles-mêmes. Que si plusieurs causes de la suppres-

sion sont conjointes , la diversité des symptômes servira de signe , pour faire le pronostic .

Le malade ne peut pas souffrir pendant plusieurs jours la suppression , sans estre fort affoibly & en danger. Lorsqu'elle est causée par une chute de matrice , il ne faut que reduire cette partie; quand les hemorroïdes pressent le col de la vessie , il est besoin de les ouvrir avec la lancette ou les sangsues ; on remédie à l'engourdissement de la vessie avec un grain de sel ou de nitre mis dans le conduit de l'urine , ou avec une mixtion de miel rosat & poudre d'hierre ; ou d'huile de scorpion : Quand il y a du sang caillé , du pus , ou du flegme épais en la vessie , on se fait d'une injection d'oxymel avec l'huile d'amandes douces ; dans l'affaissement de l'uretre on employe les bougies creuses ; on incise, on ronge la car-

nosité , ou la callosité qui s'y rencontre , & on introduit ensuite une canule de plomb. Quand on a gardé son urine trop long-temps , si le malade craint d'estre sondé , on luy met sur le pubis des sachets de parietaire humectez d'huile de capres ou de thènebentine ; après quoy , s'il n'est pas soulagé , on luy persuade de souffrir l'intromission de la sonde. On appaise l'inflammation du rectum , de la matrice , & des prostates par les frequentes saignées , & les clysteres d'oxycrat , d'eau de parietaire , ou de sa decoction avec le miel rosat , & le bain d'eau tiede.


Il est tres-important de saigner , de donner des clysteres rafraichissans & de baigner , pour toutes les suppressions d'urine , quand il n'y a point d'autre maladie apparente ; parce que d'ordinaire elles sont causées par la seule inflammation ,

& que la foiblesse où on réduit le malade , fait souvent relâcher les parties , & sortir l'urine , dont la retention le mettoit en danger de mourir.

Galien 13. de la Meth. avant Paré , L. 17. C. 37. ne conseille pas de donner des diuretiques , ny de fortes purgations avant la saignée ; parce qu'elles pourroient accélérer le mouvement des humeurs , ou des corps étrangers vers la vessie & la faire remplir davantage , pendant que l'obstruction du sphincter empêche de sortir l'urine.

Mais le malade n'est quelquefois pas foulagé , quoy qu'on luy aye fait des remèdes. Si on n'a pû le sonder , & que la maladie presse trop , il vaut mieux , sans attendre plusieurs jours , le faire consentir à la Lithotomie , s'il est incommodé de la pierre. Et s'il y a seulement de l'urine retenuë par

l'inflammation du sphincter , ou par une matiere épaisse & visqueuse , il sera necessaire de luy faire la ponction du perinée.



CHAPITRE XXI.

De la ponction du Perinée.

ON suppose qu'aucun remede n'a soulagé le malade , & que la suppression continuë avec les symptomes qui donnent lieu de faire un prognostic tres-fâcheux , & de secourir au plûtost le malade.

Le grand rapport qu'il y a entre la Lithotomie , & la ponction du perinée , donne lieu de proposer trois moyens de la pratiquer ; & comme ils n'ont point de noms propres, on les distinguera par ceux des diverses methodes de la Litho-

tomie , ſçavoir le haut , le grand , & le petit appareil.

Quoy qu'on ait dit , que le haut appareil n'eſt point en uſage , il ſemble neanmoins que la grande tumeur au deſſus du pubis , cauſée par la ſuppreſſion d'urine , particulièrement dans un ſujet atténué , rendroit l'opération facile , ſans craindre de bleſſer les parties du bas-ventre ; & que pour cét effet , ſans lier le malade , après la ponction de la lancette dans la tumeur , profondant juſqu'à la veſſie , il ſuffiroit d'introduire un ſtilet , qui ſerviroit de conducteur à une canule courbe convenable , le faiſant paſſer dans ſa cavité.

On pourroit encore pratiquer le haut appareil de la ponction du perinée , par le moyen du trocart , avec lequel on feroit la ponction dans la tumeur au deſſus du pubis ; l'on connoiſtroit ſeulement quand la

vesſie ſeroit ouverte, & en même temps on y conduiroit un ſtilet ; & après avoir retiré le trocart , le ſtilet ſerviroyt de conducteur à la canule de même qu'à la paracenteſe pour les hydropiques. Nous donnerons la deſcription de ce trocart, & la methode de ſ'en ſervir, quand nous parlerons de la troiſième façon de faire la ponction du perinée.

La ſeconde maniere qui eſt en uſage , eſt le grand appareil, comme je l'ay veu pratiquer par de grands perſonnages, dont j'ay ſui-vy la methode. Il ne faut qu'une canule môtée, une petite tante proportionnée à la cavité de la canule, deux emplâtres, deux compreſſes, l'une un peu plus grande que l'autre.

Toutes choſes étant préparées, le malade ſitué & tenu de même que pour la Lithotomie ; pour eſtre

plus assuré du chemin qu'on doit tenir en faisant l'incision , on introduit la sonde canelée dans l'uretre le plus avant qu'on peut , sans rien forcer ; si l'inflammation est mediocre , ou qu'il n'y ait point de carnosité , ny d'autres obstacles , on l'introduit dans la vessie : un serviteur tient la sonde , ou le Chirurgien la tient , & il observe toutes les circonstances comme à la taille , faisant l'incision moins basse que pour la Lithotomie , & moins longue sur la canelure , dans laquelle il pousse le bec du gorgeret , pour l'introduire plus facilement dans la vessie. Il est bon que la canelure se continuë comme une gouttiere , sans qu'il y ait aucune chose qui l'arrête au bec ou extremité de la sonde ; la sortie de l'urine est une marque assurée que le gorgeret est dans la vessie ; & pour lors on dégage la sonde , & on la retire dou-

dement. Le Chirurgicalien tient d'une main le gorgeret , & de l'autre il prend la canule droite montée & trempée dans l'huile par le bout , & il la conduit dans la vessie par le moyen du gorgeret , ou à son défaut , si il estoit sorti de la vessie , on prend le bouton à curette , & on s'en sert comme on a déjà dit. Si on n'a point de bouton , on se sert d'un gros stilet , qui estant introduit dans la vessie , sert de conducteur à la canule.

Quand on n'autoit pû introduire la sonde canelée dans la vessie avant l'opération , elle entre facilement après l'incision , parce que le peu de sang qui fort , fait dissiper les esprits qui causeroient inflammation & tension aux parties.

Tevenin au Chapitre 121. de ses opérations propose de ne point introduire de sonde , & le malade estant situé , de faire incision avec

le bistouri entre l'an^s & le scrotum , à costé du raphé , au même endroit qu'on la fait pour la Lithotomie ; estant parvenu (dit-il) proche la vessie , on l'ouvre , profondant hardiment , portant la pointe du bistouri ou lancette de bas en haut , jusques à ce que l'urine sorte , ensuite on introduit la canule , & l'opération est achevée.

Il est bon de ne pas vuider entièrement l'urine , si elle estoit d'une quantité excessive , parce que les trop grandes évacuations sont toujours nuisibles , selon Hippoc. Liv. 2. des Aphor. mais après en avoir évacué selon les forces du malade , on a une petite tante de linge dont on bouche l'orifice de la canule , & ayant mis une compresse , quelqu'un tient la main dessus , aidant à coucher le malade ; ensuite on met par dessus la tante un plumaceau épais couvert d'astringent , une petite

emplâtre , une autre compresse mediocre , & par dessus l'emplâtre à queuë couverte pareillement d'astringent , & encore une autre compresse sur l'emplâtre , une troussé pour relever les bourses & la fronde , ou le Té double avec la jarrétière , comme on a décrit. Le bandage qui est seulement contentif , n'empêche pas qu'il ne sorte un peu d'urine ; néanmoins quand le malade a pris du repos , & qu'on luy a donné de la nourriture , on le fait uriner par la canule sans la retirer.

Dans le pensément on examine si c'est un fungus qui avoit causé la suppression ; & on le connoit par le doigt , ou la sonde droite , par l'inspection des choses qui sortent avec l'urine , ou avec l'injection d'eau d'orge tiede , la deterfive , & les autres medicamens des appareils dont on se sert. Si on sentoit une pierre

il en faudroit faire l'extraction avec la cuillere , le crochet , ou la tenete.

Les fongus se détachent par les injections ; si c'est un ulcere , on se sert de remedes convenables pour le deterger. L'inflammation est traitée plus facilement que toute autre maladie , parce que souvent elle est entretenue par la retention d'urine. Quand la cause de la suppression est ostée , l'intention doit estre à la reünion des parties : c'est pourquoy on retire la canule , & on pense les malades comme les taillez , selon la cure generale , s'il n'y paroist point d'accidens , ou selon la methode particuliere par la correction de chaque symptome.

Si on ne peut introduire la sonde dans l'urètre , ou lorsque le malade n'en veut pas permettre l'usage , l'operation est plus laborieuse ; neanmoins , comme c'est une

maladie pressante , pour prolonger la vie , il est nécessaire d'opérer autrement , sçavoir par le haut appareil dont on a parlé , ou de la façon à qui on a donné le nom du petit appareil pour la ponction du périmée : pour cét effet on se servira

d'un instrument nommé trocart, d'un stilet, & d'une canule montée ; j'ay inventé ce trocart il y a cinq ans, en voicy la figure.

Ce trocart peut être fait de différens métaux , à la réserve de la pointe qui doit estre d'acier , sa longueur est de sept ou huit poulces , pour s'en servir plus commodément ; sa grosseur est comme un médiocre tuyau d'une



plume à écrire , sa figure a plusieurs circonstances ; car celle de ses extrémités qui est d'acier , est pyramidale & triangulaire. Cette pyramide est environ longue d'un travers de doigt ; à une de ses faces il y a une canelure , qui se continue depuis sa pointe , ou fort proche , jusques à l'autre bout du trocart , & cette canelure fait que le corps de l'instrument dans toute sa longueur représente une sonde droite à faire incision , parce qu'il est cave d'un costé & rond de l'autre , qui est le dehors. La pyramide d'acier grossit depuis la pointe jusques à la base , mais depuis la base jusques à l'autre extrémité le trocart est égal en grosseur.

Le stilet est droit , également gros , médiocrement menu & ployant , long d'environ huit pouces , proportionné à la canelure du trocart.

La canule montée , dont on se sert en cette operation , peut estre courbe pour s'en servir au haut appareil , & droite pour le petit de la ponction à la vessie , longue & menue à proportion de l'épaisseur & de l'âge du sujet , afin que le bout puisse estre poussé dans la vessie , sans faire une trop grande solution de continuité. Il faut observer que le bout de la canule où sont les yeux , doit estre proportionné à la partie moyenne de la pyramide du trocart , afin qu'elle puisse facilement entrer dans l'ouverture de la ponction , & que le corps de cette canule soit de figure conique , grossissant peu à peu à mesure qu'il approche de la teste où sont les anneaux. Quand la canule auroit son extrémité plus menuë , on pourroit faire sortir les eaux aussi facilement , mais elle seroit inutile , s'il y avoit quelque

matiere plus épaisse & gluante contenue dans la vessie.

Pour se servir de ces trois instrumens , on éleve les bourses , après avoir situé le malade ainsi que l'on a dit , & ayant remarqué le lieu où l'on doit faire la ponction dans le Perinée au côté du raphé , on pousse le trocart , & baissant le bout par où on le tient , la canelure dessus , on continuë de pousser la pyramide vers le corps de la vessie , qui est fort tendue , & que l'on ouvre sans peine pour cette raison. Aussitost que le trocart est dedans , l'urine coule par la canelure , & on prend le stilet que l'on conduit dans la vessie par la même canelure , ensuite on retire le trocart , au lieu duquel , tenant d'une main le stilet , on prend la canule montée , & dans sa cavité on fait passer le stilet , le long duquel on l'a fait glisser. Quand la canule est pro-

che le perinée , on prend le stilet par son extrémité , & en même temps on conduit la canule dans la vessie. On connoît qu'elle y est introduite , lorsque l'urine sort par sa cavité : Pour lors on retire le stilet , on laisse vider autant d'urine qu'on le juge à propos , & on fait le reste comme de l'autre manière dite le grand appareil : Ce trocart a cecy de particulier , qu'aussitôt que l'extrémité de la canelure est dans le lieu où sont les eaux , elles coulent , sans qu'on doive craindre d'estre trop avant.

Il y a des personnes qui se servent d'un autre trocart pour la même operation , celui-cy a une pointe d'acier , solide & ronde , longue d'environ un travers de doigt. D'autres la font faire triangulaire , ou un peu platte & trenchante des deux côtez ; néanmoins proportionnée à la canule. L'instrument

est droit & cave dans sa longueur, & proche la base de la pointe il y a deux ouvertures ; on passe cét instrument dans la canule, & en cét état on fait la ponction, dont l'ouverture est toujours plus petite que celle de la canule ; & elle n'y peut pas estre introduite, si ce n'est avec grande douleur pour le malade ; deplus il faut enfoncer plus que l'autre ce trocart-cy, avant de s'appercevoir que l'eau sorte. Chacun a la liberté d'examiner les choses, & de choisir celui qui luy plaira.

Ces trocarts peuvent servir à d'autres opérations, comme à l'espece d'hydrocele, où les eaux sont amassées, sans estre infiltrées dans la substance même des membranes ; pour la paracentese ; même pour des contr'ouvertures, & pour passer les méches à setons ; parce qu'à trois ou quatre doigts d'un bout du

trocart qu'on a décrit le premier, on y peut faire un trou comme d'une grande éguile par où on passeroit les mèches.

A chaque fois qu'on s'en sert il faut le faire affiler, car l'urine é-mousse beaucoup les trenchans. Il est bon de s'exercer à ces sortes d'opérations sur des cadâvres ; il faut pour cela syringuer le plus qu'on peut de l'eau dans la vessie, ensuite lier la verge, & faire la ponction, comme on vient de la décrire, & après faire la dissection de la vessie, pour remarquer ce qu'on a fait, & se régler une autre fois.


On évite d'offenser le rectum, conduisant la pointe de la pyramide vers la vessie, qui est fort tendue, & on ne doit pas craindre de l'ouvrir dans son corps, parce que les playes n'en sont pas absolument mortelles, & quoy qu'on dise qu'elles se réunissent plus difficilement

dans sa partie membraneuse, on doit bannir toutes ces apprehensions, parce qu'on voit par experience qu'on les guerit, & qu'il s'agit de sauver la vie à un homme qui expire.

Ceux à qui il reste des fistules après la ponction du perinée, se servent d'une canule qu'ils font boucher & ouvrir de temps en temps pour uriner : on en peut faire dont le bouchon soit à vis pour estre plus seur. Les bouts de la languette de la canule sont attachez un par devant, & l'autre par derriere à une ceinture tenuë par un colier, comme ceux qu'on a décrit parlant du bandage de la verge pour le phimosis Chapitre x. Si quelque symptome de la Lithotomie survient après la ponction du perinée, on y remédie selon son espece ; & quand ils ne paroissent point, ou qu'ils sont gueris, le malade & le Chi-

rurgien ont une agreable esperance , & chacun faisant son devoir , avec les assistances exterieures on conduit le traitement de la Lithotomie & de la ponction du perinée jusques à la guerison. Neanmoins tel soin que puisse donner le Chirurgien , & telle obeissance , confiance & patience que puisse avoir le malade , assisté comme il faut par ceux qui sont prés de luy , & par l'administration des bons remedes , on a quelquefois le déplaisir d'être incommodé d'autres maladies contenues dans le Chapitre suivant.





CHAPITRE XXII.

*Des maladies qui surviennent après
la curation de la Lithotomie, &
de leur guerison.*

G Uy de Chauliac dans son second Traité, dit que si la Metastase ne se fait point aux Apostemes, ils sont terminez par resolution, suppuration, endurcissement, & pourriture; & ensuite il parle de la maniere de les traiter, & de les guerir: Ces choses font connoître, qu'il y a difference entre leur terme, leur cure, & leur guerison. La fin d'une maladie peut estre le commencement d'une autre; La curation a une fin incertaine, quoy-que la guerison soit celle qu'on se propose selon l'Art; Nous n'en voyons que trop d'exemples dans

ceux qui sont incommodés de la pierre ; la terminaison de leur maladie est l'extraction de la pierre : Cette pierre ostée , ou cette maladie finie par l'opération , produit une playe , ou d'autres accidens , dont la curation est nécessaire ; & qui néanmoins ne se terminent pas toujours par la guérison , mais quelquefois par une nouvelle pierre , par une fistule au périnée , un écoulement involontaire d'urine , excrétion stercorale contre Nature , ou par plusieurs maladies ensemble. Elles ont chacune leurs causes , différences , signes , pronostics , & curations.

Nous ne dirons rien sur le sujet de la pierre qu'on auroit remarqué après le traitement ; il faut seulement observer que la cause en peut estre , quand il y a une carrière dans le rein , qui fournit de temps en temps des pierres à la vessie.

On différerait l'opération, à moins que le malade n'eût entièrement réparé ses forces, que la saison n'y fût pas contraire, ou qu'on pût remédier aux accidens ; & sur tout il faudroit que le malade fût partagé d'une tres-grande résolution, pour se résoudre à souffrir une seconde taille.

La fistule au perinée, dont nous parlons, est un ulcere sinueux au dessous du scrotum, avec callosité dans sa longueur, par où l'urine s'écoule. Elle est causée par la faute du Chirurgien ; de la part du malade, par les accidens qui sont survenus, ou même par plusieurs de ces choses ensemble, quand le Chirurgien, ny le malade ne font pas leur devoir, & outre cela que les accidens fâcheux & violens paroissent en même temps, ou peu après l'opération.

Par la faute du Chirurgien, lors-

que dès le commencement il laisse trop-tost reünir les lèvres de l'ulcere , sans estre asuré que le fond soit detergé & agglutiné , ou parce que n'ayant point paru d'accidens, il en a trop dilaté le fond , & qu'il n'a pas eu le soin après les huit ou dix premiers jours au plus, de comprimer mediocrement le bandage, & de se servir de petites compreses fort étroites , mises aux deux côtez de l'incision.

De la part du malade , lorsque son urine trop âcre ronge l'urètre, & empêche la reünion , ou qu'il ne garde pas le repos necessaire, n'observant pas ce qu'on luy prescrit, & ne voulant pas qu'on le traite selon les regles de l'Art, à quoy il faut ajouter la trop grande maigreur, l'abondance d'urine , & s'il ne se modère pas dans ses passions , ou dans les alimens , dont les superflui-

tez causent une suppuration trop longue.

Les accidens les plus remarquables qui contribuent à la fistule, sont la pourriture, qui cause grande perte de substance à l'urètre, & aux parties circonvoisines; l'ulcère à la vessie, ou aux reins, dont la suppuration contraint de tenir les parties dilatées.

Les différences de ces fistules se tirent de ce que les unes ont leur longueur directe depuis la peau jusques à l'urètre, sans autre sinuosité profonde, ny superficielle, & sont apparentes au côté du raphé; les autres ont leur orifice dans le rectum; les unes sont avec grande perte de substance, les autres ont une ou plusieurs sinuositez dans l'urètre, & dans les parties voisines, ou bien elles sont dans un mauvais sujet; & ces différences sont connues, si on remarque dans le temps du

penfement , trente ou quarante jours après l'operation , que l'ulcere fe cicatrife , à la réferve d'une ou plufieurs angufties, ou d'un petit tubercule , qu'on nomme cul de poule , à côté du raphé , par où l'urine s'échappe ; ou lorsque le malade étant fort atténué , & que les accidens qui font furvenus , ont caufé une grande perte de fubftance à l'urètre , ou que les chairs n'ont pû fe regenerer. La fortie de l'urine par l'anus fait connoître que l'orifice de la fistule eft dans le rectum.

Toutes les fistules au perinée ne font pas également difficiles à guerir ; car on peut traiter la premiere efpece , pourvû qu'il n'y ait pas grande perte de fubftance , & que le fujet foit bon ; les autres étant pour l'ordinaire incurables. De ceux qui font incommodez de fistules , il y en a qui ont la confolation qu'elles ne coulent pas tou-

jours. Si le sujet est bon , sans estre trop maigre ; & que l'ulcere soit rempli de chair bien conditionnée , on pourra, sans interruption , s'attacher au traitement de la fistule: Mais si le malade est attenué , ou qu'il y ait grande deperdition de substance à l'uretre avec des chairs calleuses , on n'en doit point entreprendre la cure, jusques à ce que les forces soient réparées, pour connoître si les chairs peuvét se regenerer. Il faudra pout lors le consoler , luy faisant entendre que dans une autre saison on le pourra guerir. Celles qui ont leur orifice dans le rectum, sont quelquefois moins fâcheuses , & on ne doit point les traiter.

Pour le traitement de la fistule , nous ne parlerons point icy du regime universel , on suppose qu'il a esté observé , soit dans le temps du pensément du taillé, ou après, mais on s'entretiendra seulement du re-

gime particulier de cette curation. Les Auteurs parlent de potions & de plusieurs remedes topiques sur les fistules pour les guerir : Mais comme mon dessein est de décrire seulement ce que j'ay remarqué qui a reüssi , je puis assurer que plusieurs ont esté gueris par le moyen suivant. Il consiste à introduire au fond de la fistule un trochi. que cathetrique décrit au dernier Chapitre, ensuite on procure la chute de l'escarre avec le basilicum ; on le pense après comme un taillé de sept ou huit jours. Quelques-uns se servent en même temps de bougie dessicative, qu'ils poussent par dedans la verge jusques au fond de la fistule : d'autres les guerissent sans l'usage des bougies ; quand quelque accident paroist, on doit le corriger comme on a dit au Chapitre xix.

Si les fistuleux sont à plaindre, ceux qui ont un écoulement invo-

lontaire d'urine par l'uretre , doivent estre mis au rang des infortunez , de même que ceux qui n'urinent point du tout. Ceux dont les excremens fecaux sortent contre leur volonté , les surpassent en misere. Que peut'on dire , si une personne souffroit plusieurs de ces incommoditez en même temps.

L'écoulement d'urine est causé par la paralisie du sphincter de la vessie , par l'incision de ses fibres , ou par dilaceration grande , lorsque la pierre grosse & âpre a trop élargi le passage , & en a causé une suppuration de longue durée.

Les espèces & les differences se tirent du plus , ou du moins d'écoulement ; les signes en sont visibles , ou plutôt tres-sensibles & incommodés aux malades , puisque la honte les empêche avec leur chagrin , de chercher quelquefois du remede ; d'où on peut faire le prognostic,

qu'elles sont toutes extrêmement difficiles à guerir , la plupart incurables : & que la cure n'est pour l'ordinaire que palliative.

Les femmes ne sont point sujettes aux fistules , mais seulement à cet écoulement d'urine, qui leur est plus incommode qu'aux hommes, à cause de la conformation de leur uretre , & que leur sexe qui a la pudeur en partage , leur faisant observer plus de retenue , les empêche de chercher du secours ; ce qui les oblige d'avoir des linges , ou des éponges attachées , pour recevoir les eaux , ou de se servir de quelque autre chose , que la nécessité & l'incommodité font inventer.

Quand l'écoulement d'urine reste aux hommes, ils peuvent avoir recours à une petite machine telle que j'en ay vû à une personne, dont le caractère demandoit beaucoup de précaution ; je luy ay ouï

dire qu'elle luy estoit commode & utile.

Cette machine est faite d'acier, de fer, ou d'autre métal convenable : Elle est composée de deux parties, longues chacune d'environ trois poulces, larges d'un doigt ; une des deux pieces est un peu courbée dans sa longueur, & l'autre est droite ; ces deux pieces sont jointes par un bout, où il y a une charniere comme à un compas, & à l'autre bout chacune est recourbée, pour s'engager l'une dans l'autre ; en sorte que pressant avec le doigt ; on puisse les ouvrir & les fermer. On garnit ces deux pieces avec du linge tant & si peu que l'on veut ; ensuite on fait passer la verge dans cet instrument, observant que la partie courbée soit par dessus ; & après avoir uriné, on le ferme ; la compression se fait si legere qu'on veut, garnissant plus ou moins

la machine , pour la souffrir sans douleur , & sans que l'urine passe ; ce qui supplée en quelque façon à l'action du sphincter de la vessie.

J'ay vû des personnes qui se servoient de boëtes de fer blanc , ou d'autres vaisseaux de cuir bouilly en maniere d'urinal , attachez à une ceinture , & dans lequel ils avoient toujours le balanus , ce qui ne se fait pas sans peine. Il y a un autre instrument de figure fort approchante du bandage pour les hernies ; il est fait comme les brayers d'acier , ayant la ceinture semblable , & au costé gauche au lieu d'écusson , le bout de la ceinture est coudé en dessous , pour se terminer en figure d'une petite platine que l'on garnit de feutre , de cuir , ou de liége , couvert de cire suffisamment , pour faire une figure convexe comme une olive , & mediocrement dure , pour se rencontrer justement sur l'uretre , au-

dessus & proche où on a fait l'incision de la taille. Quand le bandage est appliqué, le petit champignon comprime l'uretre par dessous les bourses, & pour le tenir ferme on l'arreste avec l'autre bout où il y a une languette de cuir de même façon qu'aux brayers d'acier pour les hernies ; & de plus, si un homme étoit incommodé de descente, on pourroit luy faire exprés un de ces bandages, où il y auroit un écusson pour la hernie, & le petit champignon pour comprimer l'uretre, & empêcher l'écoulement d'urine. Quoyque ce bandage soit proprement pour la cure palliative de cette maladie, il peut quelquefois servir à une veritable curation, parce que les parties se fortifient.

Il y a encore un autre bandage, dont la ceinture est faite de futaine, & l'endroit qui doit passer sur le pubis, est composé d'un morceau

de bois long & gros comme le petit doigt du malade , couvert de la même futaine & de cire , entre lequel & le pubis on comprime la verge , & on la fait coucher le long en montant. Cette situation empêche l'écoulement ; il y a au même bandage des éguillettes attachées à la partie de devant , pour les faire passer entre les cuisses , & les lier à la ceinture latéralement , afin que le bandage ne monte pas trop haut.


L'excretion stercorale involontaire est causée quelquefois par la faute du Chirurgien, si dans le tems de la Lithotomie il fait l'incision trop bas , & s'il coupe le rectum, principalement dans le petit appareil , s'il n'y prend garde ; le plus souvent les mouvemens violens du malade y contribuent , & encore plus la pourriture , les abcez , ou

les autres accidens qui surviennent après l'opération.

Leurs espèces, leurs signes, & leurs prognostics sont tirez de l'éjection plus ou moins grande des excréments fecaux par la fistule qui reste, ce qui est bien plus incommode que l'écoulement d'urine ou la fistule seule. La guérison de l'excretion stercorale est impossible, lorsqu'elle est causée par incision de la partie supérieure du sphincter du rectum, ou qu'il y a grande perte de substance ; si on entreprend d'en traiter les malades, on doit se régler sur la méthode des fistules de l'anüs.

Il n'est pas besoin de s'étendre ; pour prouver que ces sortes de maladies peuvent avoir plusieurs causes à la fois : Quand il y a plusieurs de ces indispositions ensemble, on doit pareillement avoir recours au traitement des maladies compli-

quées , tant pour le prognostic , que pour l'ordre des complications.



CHAPITRE XXIII.

Des remedes pour se preserver de la pierre , pour faire vuider le calcul , & des medicamens pour penser les tailles.

ON a promis d'examiner quels remedes peuvent preserver de la pierre ; il faut neanmoins avouer qu'il est fort difficile , & peut-être impossible de déterminer précisément en quoy ils consistent , puis que les plus sçavans en découvertes Physiques, n'ont parlé qu'en général des figures des corps , & que les Microscopes n'ont pû faire connoître la nature de chacun en particulier , non plus que de tous les

pores. Peut-être que l'on pourroit réussir sans observer toutes ces circonstances ; car quand on auroit poussé les recherches sur la nature jusques à ce point , il y auroit encore des causes qui ne dépendroient pas de nous , & qui pourroient former la pierre. La grosseur, la figure, le nombre & le mouvement des minuties des corps , dont nous sommes composés , & de ceux qui nous servent d'alimens , ne sont aucunement en nôtre puissance ; quoyque ces choses fussent pour nous causer les malheurs que nous craignons , si les secretions & les excretions ne sont pas faites selon l'ordre naturel. Pour profiter du malheur des autres , il faut considérer que ceux qui sont le plus sujets au calcul ou à la pierre , vivent d'une manière , qu'on peut éviter , ou du moins la corriger par d'autres choses ; & comme nous avons parlé des

lieux marécageux , de l'air grossier, des alimens pierreux, eaux borbeuses, & des excez qui peuvent beaucoup debilter les parties du corps, on doit les éviter soigneusement, prenant modérément de toutes les choses dont on peut se nourrir, faisant exercice proportionné aux forces, sans trop se deliquer. Il vaut mieux en faire un peu plus, que pas assez, parce que la vie consiste dans l'action, & que chacun est assez amy de soy-même, pour prendre le repos ; si on ne fait point d'excez, les parties du corps s'entretiennent dans une santé utile à toute rencontre.

Quoyqu'il y ait peu de choses, qui contribuënt plus à former la pierre dans la vessie, que d'être fort long-temps sans uriner, il ne faut pas pourtant d'abord donner des diuretiques, mais seulement des purgatifs doux, pour vuider les in-

testins & les parties qui leur sont voisines ; de cette sorte sont la manne , la casse , le catholicum double , le lenitif fin , le diaprunum simple : un jour ou deux après on peut faire prendre en breuvage la Therebentine préparée de cette façon. On prend une once ou six gros de la meilleure Therebentine , sans être lavée , on la dissout dans le mortier avec un peu de jaune d'œuf , ensuite on adjoûte deux ou trois onces d'eau de vesicaire , ou d'ache , ou de parietaire , ou de quelque autre liqueur (selon la nature de la maladie , & l'état du malade) on agite le tout , afin que le mélange se fasse , & devienne de couleur si blanche , qu'il semble que ce soit de la crème , ou du lait caillé. Bever. C. XI. du calc. des R. & de la vessie. Le bain soulage ceux qui sont incommodés du calcul , & souvent il contribué à faire descendre des reins , & faire

sortir de la vessie les petites pierres qui s'y arrêtent.

L'usage de la tisanne suivante est fort utile pour les mêmes maladies. On la fait avec une once de graine de lin , & des racines de mauves & de guimauves , de chacune deux onces , sur cinq pintes d'eau , reduites à quatre dans l'ébullition , & sur trois onces de cette tisanne on peut mettre quatre ou cinq gouttes d'esprit de soufre ; on fortifie cette tisanne , augmentant la doze sur pareille quantité d'eau ; elle est éprouvée pour faire uriner , cesser la douleur , & vider les pierres.

Les deux receptes suivantes m'ont esté données par Monsieur Jonnot , dont il m'a dit que la premiere luy a souvent reüssi pour les douleurs nephritiques , & pour ceux qui sont sujets à jeter du petit calcul ; & la seconde ne luy a jamais manqué , pourvû que le calcul soit

DE LA LITHOTOMIE. 237
de grosseur , qu'il puisse sortir du
bassinnet du rein.

L'usage de ce premier remede est
de le prendre au Printemps , & à
l'Automne , trois jours de suite cha-
que matin. Prenez six onces d'eau
de parietaire , une once d'huile d'a-
mandes douces , & une once & de-
mie de syrop de limons ; dans la
necessité il se prend en tout temps.

Pour le second remede , il faut
estre saigné une ou deux fois , &
estre purgé deux fois , avec deux
verres de tisanne de chiendant, ra-
cines de guimauves , le noët de lin,
dans lesquels on fera infuser deux
ou trois dragmes de sené pendant
la nuit ; & dans la colature y adjoû-
ter une once de cassé mondée pour
chaque dose : Puis le lendemain on
se servira à jeun de la limonade sui-
vante , & on continuëra trois jours
de suite au déclin de la Lune , &

on fera trois ou quatre heures sans manger.

Prenez de l'argentine , lentille d'eau , & du creillon de chacun une poignée, que ferez boüillir demy-quart d'heure dans une pinte d'eau , & y adjointerez en l'ostant du feu , le jus & écorse de trois ou quatre citrons ; laissant infuser le tout ensemble quatre heures , puis le passerez , & y adjointerez trois onces de sucre candi en poudre , & vingt grains d'esprit de sel gardez le tout pour s'en servir comme on a dit.

La flambe qui croit sur les murailles , infusée à froid , de telle quantité qu'on veut , dans du Vin blanc , & l'infusion prise à la quantité d'une once pour la premiere fois aux personnes de dix à douze ans , fait vuidier le calcul ; on augmente , ou on diminue la quantité selon l'âge & l'effet , obervant d'en donner

plûtost moins que trop , crainte de faire couler trop abondamment le calcul vers le sphincter de la vessie; ce qui causeroit une suppression d'urine. On peut réitérer deux ou trois jours après , & se purger selon l'avis du Medecin. L'usage du Vin blanc , de l'eau de raves , & le Vin de gouffe d'églantier est bon réitéré de temps en temps.

Paracelse enseigne à la fin de la Preface du second Traité de sa grande Chirurgie , que pour remédier à la suppression d'urine , il faut se servir des pierres qui se trouvent dans les têtes d'Ecrevisses , mises en poudre subtile , les faire boire avec suc ou eau de raifort , & s'ils ne font pas pisser , qu'on prenne du safran autant qu'il en faut pour faire un sachet , & le poser sur les reins ou sur le ventre , vers le passage des ureteres , & sur le périnée : Ou faire de la poudre de glands de chêne séchez,

& la faire boire avec eau ou suc de raifort , autant que le Medecin le jugera à propos.

Les deux remedes suivans sont éprouvez pour faire vuider le sable & les petites pierres. Quand la Lune est en decours , après avoir esté purgé , prenez le matin gros comme une noix de beurre frais , avalez-le en maniere de pilule ; ensuite ayez un citron aigre , dont vous exprimerez le jus dans quatre onces de Vin blanc ; vous boirez cette potion un quart d'heure après avoir avalé le beurre ; on pourra reïtérer deux ou trois jours après selon l'effet , & se purger ensuite.

Pour le même effet , prenez un petit oignon blanc , coupez-le par morceaux , que vous ferez infuser pendant la nuit sur des cendres chaudes dans quatre onces de Vin blanc , passez le tout ; la quantité de beurre frais prise comme dessus , il faut

faut un quart-d'heure après boire cette infusion ; elle est plus violente que l'autre. On fait prendre premierement le beure , afin que le ventricule ne soit point trop picoté par le Vin , le jus de citron , ou d'oignon : Et il faut remarquer que si on prenoit d'une seule fois une quantité beaucoup plus grande que ces doses , au lieu de soulager le malade , on l'exposeroit encore à une suppression ; parce que ces remèdes sont fort diuretiques , & entraînent avec rapidité ce qu'ils rencontrent.

On dit que la pierre de Jade a tant de vertu , qu'il suffit de l'attacher au bras , ou la porter sur soy , pour estre soulagé de la Nephritique , & pour faire vuider le calcul & le sable.

L'infusion à froid faite du bois Nephritique est excellente ; on met telle quantité qu'on veut de ce bois

dans l'eau , qui en reçoit la ceinture ; on en prend deux verres le matin , & un sur le soir , ou à d'autres heures du jour , ayant l'estomac vuide ; Ce remede appaise la douleur , & fait vuider du sable.

Le boüillon suivant est décrit dans Paré , Livre 17. Chap. 37. & dit qu'il est experimenté , & d'un effet merveilleux , pour empêcher que la pierre se forme , & s'endurcisse : Prenez un coq & un jarret de veau , qu'on fera cuire avec eau , & une poignée d'orge , racines de persil , oseille , fenouil , chicorée , brusci , de chacun une once ; des quatre semences froides concassées , de chacune demy - once ; à la fin on adjouâtera feuilles d'oseille , pourpier , laiçtuë , sommittez de mauves , violettes de Mars , de chacune demy-poignée ; puis sera gardé le boüillon , duquel le malade prendra par quatre matins , deux heures

avant manger , la quantité de demy-septier , avec un peu de jus de citron , le faisant bouillir un bouillon avant chaque prise , on verra dit-il , bien-tost une operation merveilleuse , & c'est un aliment medicamenteux.

Il donne au même endroit la description d'une poudre singuliere contre la pierre *Nucleorum Mespil. unc. 1. pul. Elect. diatrag. frigidi drac 2. quatuor seminum frig. majorũ mundatorum , glycyrrhisa rasa ana drac. 1. sem. saxif dr. 2. seminum Milij solis , genista , pimpinella, brusci & asparagi ana scrup. 1. semin. Althea dr. 1. semis. saccari albißimi unc. 6. fiat pulvis.* Il faut user de cette poudre les premiers jours de la Lune nouvelle , & du premier quartier , de pleine Lune , & du dernier quartier, & tous les mois ensuivans , & en prendre la quantité d'une cuillerée au matin , trois heures devant

manger. Il adjoûte la description de la poudre suivante pour le même effet. R.- Coriand. præp. scrup. 4. anisi, Marathri, granor alkekengi, milijsolis an. drac. 2. Zinzib. cinnamomi an. scrup. 2. turbith Elect. drac. 1. carui scrup. 2. galang, nucis Moscata, & lapid. Iudaici an. scrup. 1. foliorum senæ mundatorum ad duplum omnium, diagrediij dr. 2. semiss. misce & fiat pulvis. dosis erit ad dr. 1. cum vino albo. capiat æger tribus horis ante prandium. Les clysteres propres à diminuer les douleurs nephritiques doivent estre composez de décoction faite de lactuë, scariole, pourpier, fleurs de violettes & nenufar, melilot, camomille, anet, feüilles de mauves, guimauves, son, graine de lin ; & dans la colature y dissoudre de la casse mondée, un peu de sucre, & des jaunes d'œufs, même la Therebentine y est souveraine.

Benerovicius parle de quantité de remèdes ; mais comme on peut y avoir recours , nous passerons sous silence leurs descriptions , pour parler des remèdes dont on se sert après l'opération , & pour la correction des accidens.

Ils n'ont rien de particulier ; si non qu'ils doivent estre ^{moins} ~~plus~~ humectans que pour les autres parties. Chaque Chirurgien fait ses poudres astringentes , & autres remèdes pour résister à la pourriture , & pour la generation des chairs. Quelquefois les culs de poules sont séchez avec un peu d'alun de roche calciné , & le charpi sec rapé , ou bien on y adjoûte la poudre de plomb brûlé , malaxé , avec fort peu de diapalme , ou le dé minio : On fait un tres-bon épulotique avec pompholix une once , dé minio demie once , alun de roche calciné deux dracmes, incorporez le tout en-

semble. On compose pareillement un fort-bon dessicatif avec le bol & la litarge d'or, de chacune une once, sel de Saturne & pierre medicamentouse de Crollius, de chaque une dragme; ayant reduit le tout en poudre; on en fait un onguent avec suffisante quantité d'huile rosat.

Pour oster la callosité des fistules, on peut se servir de la poudre qui se trouve au fond de l'eau sphagdenique: On prend telle quantité qu'on veut de cette poudre, on la laisse sécher à l'ombre, ensuite on la broye sur le porphyre, ou sur le marbre; on y adjointe un peu d'eau, dans laquelle on a fait dissoudre de la gomme Arabique; pour en faire des trochisques longs & menus de diverses figures.

On fait un catheterique plus violent & plus efficace pour le même effet, avec parties égales de subli-

mé corrosif & alum de roche calciné , un peu d'opium & de safran; il faut broyer le tout ensemble , & pour donner corps , adjoûter de l'eau gommée autant qu'il en sera nécessaire, & faire trochisques selon l'Art.

Nous ne devons pas oublier la description du baûme d'Arceus , qui sert de digestif pour le pensem. il est décrit ainsi. *R. Gummi & therebentina abietina quam vulgo de abiete vocant ana unc. 1. sem. sēpi castrati antiqui & liquefacti unc 2. pinguedinis porcina antiqua liquefacta unc. 1. misce & ad ignem linimentum facito.* Arceus Livre premier de la bonne Methode de guerir les maladies , dit que ce remede a tant de vertu , qu'avec une demy - once on en peut guerir les plus grandes playes , pourvû qu'il n'y survienne aucun accident ; on y adjoûte quelquefois de l'huile d'hipericum au-

tant qu'on le juge à propos, selon l'intention qu'on a de s'en servir.

Paré donne la description de l'huile d'œuf page 752. *R.* des jaunes d'œufs durcis, que l'on éminse entre les mains, pour estre fricassiez dans une poêle sur un feu mediocre, remüant toujours avec avec une cuillere, jusqu'à ce qu'ils deviennent roux outannez, & que l'huile en sorte, ensuite on les enveloppe d'une étamine faite de crin de cheval, & on exprime l'huile comme celle d'amande, & on la garde pour l'usage.


On peut adjoûter icy la description de la gelée de corne de Cerf, qui est excellente pour le cours de ventre qui survient aux taillez; elle se fait avec deux onces de corne de Cetr & deux onces de racure d'yvoire sur une pinte d'eau; qu'on fait boüillir jusques à ce qu'on aye tiré leur suc; on passe ensuite

la décoction chaude par la chauffe à hypocras , on clarifie la colature avec le blanc d'œuf battu , & on y met un peu de jus de citron , du sucre blanc & de la canelle ; on remet la colature sur le feu , & quand elle commence à bouillir il s'élève une écume blanche , on met pour lors un peu de Vin blanc pour faire baisser l'écume , & peu de temps après quand l'écume s'élève on y jette encore un peu de Vin blanc ; on laisse consommer l'humidité jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que la liqueur soit gluante , pour lors on la retire , & on la fait couler promptement par un linge blanc l'exprimant médiocrement , on la reçoit dans des vaisseaux , pour s'en servir au besoin ; on en donne de temps en temps au malade environ la quantité d'une cuillerée ou deux à la fois , pour arrêter le cours de ventre.

A D D I T I O N.

DAns la maniere où l'Operateur tient la sonde pour tailler page 140. on a obmis à faire remarquer , que le serviteur peut d'une main relever le scrotum , pendant qu'avec l'autre qui est étendue , il appuye fortement sur le perinée , faisant passer entre deux doigts l'endroit où l'Operateur veut faire l'incision. Le serviteur peut faire encore autrement, il suffit qu'il cache ses deux poulces en ses mains, & avec les deux indices il étendra le perinée pour le mesme effet.

F I N.



OBSERVATIONS.

EN l'année 1682. j'ay veu à
ES. Omer chez les RR. PP.
Iesuites Anglois, une Pierre qui
avoit esté tirée d'un Cadavre
humain, laquelle pesoit vingt-
huit onces.

En l'année 1689. j'ay veu à
Paris une autre Pierre qui pesoit
trente-deux onces & six drag-
mes; elle avoit esté apportée
d'Ecosse, & tirée apres la mort
du malade.

En l'année 1690. au mois de
Juin, dans l'Hôpital de la Cha-
rité des hommes à Paris, il s'est
trouvé dans la vessie d'un Cada-
vre, une Pierre qui pesoit cin-
quante-une once.

TOLET.

RECEVEZ

En l'année 1682 j'ay veu à
Paris, chez M. R. R. P.
Isaac Anglois, une Pierre qui
avoit esté tirée d'un Cadavre
humain, laquelle pesoit vingt
huit onces.

En l'année 1682 j'ay veu à
Paris une autre Pierre qui pesoit
trente-deux onces & six drag-
mes; elle avoit esté apportée
d'Espagne, & étoit tirée d'un
mort.

En l'année 1680 au mois de
Juin, dans l'Hôpital de la Charité,
où des Docteurs à Paris, il se
trouve dans le Cadavre d'un
vieil, une Pierre qui pesoit
quatre-vingt onces.

TOUR

*APPROBATION DES
Docteurs en Medecine.*

SUR le rapport de Messieurs
Rainfant, & Legier, Docteurs
en Medecine de la Faculté de Pa-
ris, qui ont lû & examiné le Traité
de la Lithotomie composé par le
sieur Tolet Maître Chirurgien Juré
à Paris, & de l'Hôpital de la Cha-
rité des hommes, j'en consens l'édi-
tion, & qu'il soit imprimé. A Paris
ce premier Juillet 1681.

LIENARD, Doyen
de la Faculté.



*A P P R O B A T I O N D E S
Maîtres Chirurgiens Jurez
à Paris.*

LE Traité de la Lithotomie ou
extraction de la pierre hors
la vessie , composé par François
Tolet Maître Chirurgien Juré à
Paris , & de l'Hôpital de la Cha-
rité des hommes , est conforme à
l'expérience , & il contient exacte-
ment ce qu'on doit sçavoir & faire
touchant cette Operation. Le Pu-
blic doit en esperer beaucoup d'u-
tilité. C'est le témoignage que nous
luy en rendons. Fais à Paris ce 18.
jour de Decembre 1681.

FELIX,	JONNOT.
Conseiller , & pre-	MOREL
mier Chirurgien	BEISSIER
du Roy.	

TANQUERED, Conseiller,
& premier Chirurgien de Monsieur
frere unique du Roy.



TABLE

DES CHAPITRES.

CHAPITRE I.

CE que c'est que Lithotomie. page 19

CHAP. II. Des observations sur les parties du Corps humain. p. 21

CHAP. III. Des causes de la pierre. p. 24

CHAP. IV. Des consequences qui se tirent du Chapitre precedent, & comment on definit la pierre. p. 28

CHAP. V. Comment les pierres sont formées & augmentées dans la vessie. p. 35

CHAP. VI. Des especes des pierres. p. 41

CHAP. VII. Des signes diagnostics,

TABLE

<i>& prognostics des pierres.</i>	p. 51
CHAP. VIII. <i>Des choses que le Chirurgien doit observer avant l'operation.</i>	p. 62
CHAP. IX. <i>De la methode de sonder.</i>	p. 71
CHAP. X. <i>Du Phimosis , & de la pierre dans l'uretre.</i>	p. 80
CHAP. XI. <i>Du temps pour sonder , & pour faire la Lithotomie , de la diette du malade , & du premier appareil.</i>	p. 86
CHAP. XII. <i>De la situation des enfans pour les tailler.</i>	p. 102
CHAP. XIII. <i>Des differentes methodes de l'extraction de la pierre selon les Egyptiens, pratique du haut appareil.</i>	p. 106
CHAP. XIV. <i>Pratique du petit appareil pour les hommes.</i>	p. 114
CHAP. XV. <i>Methode du petit & du grand appareil pour les femmes.</i>	p. 122
CHAP. XVI <i>Pratique du grand appa-</i>	

DES CHAPITRES.

reil pour les hômes , & des circonstances dans le temps de l'operation. p.125

CHAP. XVII. *Du temps qu'on peut tenir le malade dans l'operation, & ce qu'il faut faire quand elle est laborieuse.* p.157

CHAP. XVIII. *Des symptomes de la Lithotomie.* p.161

CHAP. XIX. *De la methode pour le pensemment des taillez , contre leurs symptomes.* p.170

CHAP. XX. *De l'Ischurie ou suppression d'urine.* p.192

CHAP. XXI. *De la ponction du perinée.* p.200

CHAP. XXII. *Des maladies qui surviennent après la curation de la Lithotomie, & de leur guerison.* p.217

CHAP. XXIII. *Des remedes pour se preserver de la pierre , faire vuidier le calcul & des medicamens pour penser les taillez.* p.232

Extrait du Privilege du Roy.

PAR Grace & Privilege du Roy, donné à S. Germain en Laye le 18. jour de Decembre 1681. Signé Bouvor. il est permis à François Tolet, Maître Chirurgien Juré à Paris, & de l'Hôpital de la Charité des hômes, de faire imprimer par tel Imprimeur & Libraire qu'il luy plaira, un Livre qu'il a composé intitulé, *Traité de la Lithotomie, ou extraction de la pierre hors la vessie*, en tels volumes, marges & caractere que bon luy semblera, pendant le temps de quinze années, à compter du jour que ledit Livre sera achevé d'imprimer pour la premiere fois, avec deffenses à tous autres Imprimeurs, Libraires, ou autres, de faire imprimer, vendre ou debiter ledit Livre sans son consentement, sous les peines portées dans les Lettres dudit Privilege.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris le 15. Janvier 1682. Signé C. ANGOT, Syndic.

Achévé d'imprimer le 30. Avril 1682.

